

## Legenda

Toegevoegde tekst: Toegevoegd

Verwijderde tekst: ~~Verwijderd~~

# Databaseversies

Oude versie: NTS-10-50-241201-xml

Nieuwe versie: NTS-11-10-250530-xml

## Adviezen

- 1) Advies "Contactadvies kraamvrouw hoogurgent" is toegevoegd.
- 2) Advies "Kraamvrouw hoogurgent" is toegevoegd.
- 3) Advies "Partus instructie" is toegevoegd.
- 4) Advies "Trauma vinger/teen" is toegevoegd.
- 5) Advies "Bloedneus" is gewijzigd:
  - *Inhoud* is gewijzigd: "Non-trauma: zie thuisarts.nl: bloedneus Trauma: nietsnuiten ~~niet-snuiten~~ !!! Zie verder ook thuisarts.nl: bloedneus "
- 6) Advies "Contactadvies diabetes" is gewijzigd:
  - *Inhoud* is gewijzigd: "Contact opnemen als glucose lager is dan 3,9 ~~5~~ of hoger dan 15 mmol/l. "
- 7) Advies "Contactadvies vaginaal bloedverlies hoogurgent" is gewijzigd:
  - *Relevant voor geslacht* is gewijzigd van "Mannen & vrouwen" naar "Vrouwen"
- 8) Advies "Contactadvies VLK behandelaar" is gewijzigd:
  - *Inhoud* is gewijzigd: "Is de patiënte zwanger of kraamvrouw? ~~zwanger?~~ Verwijs dan door naar de VLK behandelaar! U2: neem direct contact op met uw eigen verloskundige of gynaecoloog. Lukt dat niet binnen een kwartier, neem dan direct weer contact op met ons. U3, U4 of U5: neem contact op met uw eigen verloskundige of gynaecoloog. Lukt dat niet binnen een uur, neem dan weer contact op met ons. "
  - *Relevant vanaf* is gewijzigd van "12 jaar" naar "10 jaar"
  - *Relevant tot* is gewijzigd van "" naar "55 jaar"
- 9) Advies "Contactadvies ziek kind hoogurgent" is gewijzigd:
  - *Naam* is gewijzigd van "Contactadvies ziek kind hoogurgent" naar "Contactadvies ziek kind / koorts kind hoogurgent"

- *Inhoud* is gewijzigd: "Bel direct terug bij verergering of nieuwe klachten: verminderd bewustzijn hoorbare ademhaling kwijlen benauwdheid grauwontstaan ~~bewustzijn benauwdheid grauwontstaan~~ van rode vlekjes op de huid. "

10) Advies "Contactadvies zwangerschap hoogurgent" is gewijzigd:

- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "12 jaar" naar "10 jaar"
- *Relevant tot* is gewijzigd van "50 jaar" naar "55 jaar"

11) Advies "Corpus alienum" is gewijzigd:

- *Inhoud* is gewijzigd: "Doe geen pogingen het vreemde voorwerp te verwijderen. ~~Wacht op professionele hulp.~~"

12) Advies "Distorsie teen" is gewijzigd:

- *Inhoud* is gewijzigd: "Koelen kan verlichting van pijn en zwelling geven. ~~Neem~~ direct pijnstilling in en continueer dit gedurende 2-3 dagen. Een dakpanpleisterverband waarmee 2 tenen aan elkaar gefixeerd worden kan steun geven. Tevens het dragen van een schoen met dikke zool werkt pijnstillend. Bij pijn en zwelling voet eerste dagen hoog houden. Vaak zal de teen blauw verkleuren; dit is niet verontrustend. "

13) Advies "Epipen" is gewijzigd:

- *Inhoud* is gewijzigd: "Instructie epipen: Pak de pen in het midden vast Luister nu eerst goed naar de instructie en doe nog niets Haal zometeen ~~instructie~~ Haal de veiligheidsdop eraf Zet daarna de andere (gekleurde) kant van de epipen loodrecht stevig tegen de dij tot u een klik hoort. Dit mag door de kleding heen. Houd dan de epipen 10 seconden stevig op zijn plaats. Begrijpt u dit? Haal dan nu de veiligheidsdop eraf en plaats de andere kant van de pen in het been tot u de klik hoort. Ik tel 10 seconden met u mee. Verwijder de pen nu loodrecht uit het been. Wrijf 10 seconden over de injectieplek. De epipen kan ook gebruikt worden bij zwangeren. "

14) Advies "Licht vaginaal bloedverlies <16 wkn met echo" is gewijzigd:

- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "12 jaar" naar "10 jaar"
- *Relevant tot* is gewijzigd van "" naar "55 jaar"

15) Advies "Partus, vaginaal bloedverlies bij placenta praevia" is gewijzigd:

- *Naam* is gewijzigd van "Partus, vaginaal bloedverlies bij placenta praevia" naar "Vaginaal bloedverlies bij placenta praevia"
- *Inhoud* is gewijzigd: "Vaginaal bloedverlies en laag- of voorliggende placenta: ~~placenta en > 34 weken:~~ op de linkerzij ~~linker zij~~ liggen, geen kussen onder het hoofd. "
- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "12 jaar" naar "10 jaar"
- *Relevant tot* is gewijzigd van "50 jaar" naar "55 jaar"

16) Advies "Reanimatie volwassene" is gewijzigd:

- Stappenplan "Instructie" (id 24) is gewijzigd:
  - Stap 'Rugligging' (id 161) is gewijzigd:
    - *Tekst van blok* (id 387) is gewijzigd: "Leg het slachtoffer op de rug op een harde ondergrond. Indien zwanger vanaf 20 weken: leg iets (kussen/jas/handdoek/etc...) onder haar rechterbil zodat deze ca. 10 à 20 cm omhoog komt. "
    - *Tekst van blok* (id 387) is gewijzigd: "Lay the victim on his back on a hard surface. If pregnant from 20 weeks: put something (pillow/coat/towel/etc...) under her right buttock so that it rises about 10-20 cm. "
    - *Tekst van blok* (id 387) is gewijzigd: "Legen Sie das Opfer auf dem Rücken auf eine harte Unterlage. Bei einer Schwangerschaft ab der 20. Woche: Legen Sie etwas (Kissen/Mantel/Handtuch/etc...) unter die rechten Hinterbacke, so dass diese etwa 10-20 cm ansteigt. "

17) Advies "Seksueel geweld" is gewijzigd:

- *Inhoud* is gewijzigd: "Advies bij aanranding of verkrachting in de afgelopen 7 dagen: Contact opnemen met Centrum met Seksueel centrum Geweld seksueel geweld (<http://www.centrumseksueelgeweld.nl>) en eventueel daarna met de politie. Niet douchen of wassen. Geen tanden poetsen. Niet naar het toilet gaan. Niet eten of drinken. Kleding niet in de was doen, liefst bewaren in een papieren zak. Denk aan MAP "

18) Advies "Stabiele zijligging, zwanger" is gewijzigd:

- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "12 jaar" naar "10 jaar"
- *Relevant tot* is gewijzigd van "50 jaar" naar "55 jaar"

19) Advies "Zwangerschap, hevig vaginaal bloedverlies" is gewijzigd:

- *Inhoud* is gewijzigd: "Op de rug liggen linker met de zij benen liggen, omhoog. Geen geen kussen onder het hoofd. Zwangere warm toedekken .Wees alert op shockverschijnselen."
- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "12 jaar" naar "10 jaar"
- *Relevant tot* is gewijzigd van "50 jaar" naar "55 jaar"

20) Advies "Zwangerschap, hevige pijn" is gewijzigd:

- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "12 jaar" naar "10 jaar"
- *Relevant tot* is gewijzigd van "50 jaar" naar "55 jaar"

21) Advies "Zwangerschap, plankharde buik" is gewijzigd:

- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "12 jaar" naar "10 jaar"
- *Relevant tot* is gewijzigd van "50 jaar" naar "55 jaar"

22) Advies "Zwangerschap, stomp-buiktrauma" is gewijzigd:

- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "12 jaar" naar "10 jaar"

- *Relevant tot* is gewijzigd van "50 jaar" naar "55 jaar"

23) Advies "Zwangerschap, uitgezakte delen" is gewijzigd:

- *Inhoud* is gewijzigd: "~~Op Of op~~ onderarmen en knieën gaan ~~zitten: zitten~~ ( met de billen in de lucht en het hoofd op de onderarmen) ~~.Als -Als~~ dat niet ~~lukt: gaat:~~ billen op een kussen, zodat ~~het~~ onderlijf hoger komt te liggen. ~~Voorkom dat Niet de plassen. Uitgezakte navelstreng navelstreng: voorkom dat deze~~ afkoelt door deze terug te duwen in de vagina. ~~Niet plassen.~~ Uitgezakte arm of been: niet persen. "
- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "12 jaar" naar "10 jaar"
- *Relevant tot* is gewijzigd van "50 jaar" naar "55 jaar"

24) Advies "Contactadvies koorts kind hoogurgent" is verwijderd.

25) Advies "Doofheid, subacuu" is verwijderd.

26) Advies "Klachten na oog-OK of laserbehandeling of injectie <4 wkn" is verwijderd.

27) Advies "Partus" is verwijderd.

28) Advies "Partus, baby geboren" is verwijderd.

29) Advies "Partus, baby geboren <28 weken" is verwijderd.

30) Advies "Partus, baby huilt niet " is verwijderd.

31) Advies "Partus, continue hevige buikpijn" is verwijderd.

32) Advies "Partus, fors vaginaal bloedverlies" is verwijderd.

33) Advies "Partus, geboorte placenta" is verwijderd.

34) Advies "Partus, insult" is verwijderd.

35) Advies "Partus, liggingsafwijking" is verwijderd.

36) Advies "Partus, met intacte vliezen " is verwijderd.

37) Advies "Partus, navelstreng om nek" is verwijderd.

38) Advies "Partus, stuitligging" is verwijderd.

39) Advies "Partus, uitgezakte navelstreng" is verwijderd.

40) Advies "Uitgezakte delen" is verwijderd.

41) Advies "Zwangerschap, insult" is verwijderd.

## Ingangsklachten

42) Ingangsklacht "Kraamvrouw" is toegevoegd.

43) Ingangsklacht "Beenklachten" is gewijzigd:

- Gerelateerde ingangsklacht "Kraamvrouw" is toegevoegd.

44) Ingangsklacht "Braken" is gewijzigd:

- Bestaande voorwaarde voor urgentiecategorie verwijderd:
  - advies 'U2'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Schedeltrauma' >= 'Zeer recent (<24 uur)'
- Bij voorwaarden voor advies vervolgactie 'AMBU' (id 97) het triagecriterium 'Braken' >= 'Aanhoudend' toegevoegd

45) Ingangsklacht "Brandwond" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Trauma vinger/teen'
  - indien 'U2'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Trauma vinger/teen'
  - indien 'U3'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Trauma vinger/teen'
  - indien 'U4'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Trauma vinger/teen'
  - indien 'U5'

46) Ingangsklacht "Buikpijn volwassene" is gewijzigd:

- *Info* is gewijzigd: "Pijn tussen middenrif en bekken bij personen vanaf 12 jaar, zonder trauma. Inclusief maagklachten en pijn in de flank. Indien (mogelijk) zwanger: zie ingangsklacht 'Zwangerschap en buikpijn'. Indien maximaal 6 weken geleden bevallen: selecteer 'Kraamvrouw'. "
- Nieuwe voorwaarde voor urgentiecategorie toegevoegd:
  - advies 'U1'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Ontstaan buik-/rugpijn' >= 'Per acuut hevig met excessief zweten'
- Gerelateerde ingangsklacht "Urinewegproblemen" is toegevoegd.
- Gerelateerde ingangsklacht "Kraamvrouw" is toegevoegd.

47) Ingangsklacht "Corpus alienum" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor advies vervolgactie toegevoegd:
  - advies 'HA'
  - en 'Corpus alienum ingeslikt/ingeademd' = 'Ja, en klachten'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Corpus alienum in het oog'

- o en 'Oogletsel' = 'Corpus alienum'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - o advies 'Doorboord oog'
  - o en 'Oogletsel' >= 'Doorboord oog'

48) Ingangsklacht "Diabetes" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor urgentiecategorie toegevoegd:
  - o advies 'U2'
  - o voor triagetype 'Alle'
  - o en 'Type diabetes' >= 'Onbekend'
- Nieuwe voorwaarde voor advies vervolgactie toegevoegd:
  - o advies 'SEH'
  - o en 'Type diabetes' >= 'Onbekend'

49) Ingangsklacht "Geslachtsorgaanklachten" is gewijzigd:

- *Info* is gewijzigd: "Pijn, jeuk en/of afscheiding aan het geslachtsorgaan, met of zonder trauma. Bij vaginaal bloedverlies, bloedverlies bij zwangerschap, vochtverlies bij zwangerschap, urinewegproblemen of huidklachten: trieer met de desbetreffende ingangsklacht. Indien maximaal 6 weken geleden bevallen: selecteer 'Kraamvrouw'. "
- Gerelateerde ingangsklacht "Kraamvrouw" is toegevoegd.

50) Ingangsklacht "Hoofdpijn" is gewijzigd:

- *Info* is gewijzigd: "Pijn in de schedel; subarachnoidale bloeding (SAB) of meningitis zijn de gevaarlijkste aandoeningen. Neurologische uitval of acuut verslechterde visus zijn ook verdacht. ~~Indien (mogelijk) zwanger: zie ingangsklacht 'Zwangerschap en overige klachten'.~~ Indien (mogelijk) zwanger: zie ingangsklacht 'Zwangerschap en overige klachten'. Indien maximaal 6 weken geleden bevallen: selecteer 'Kraamvrouw'. "
- Gerelateerde ingangsklacht "Kraamvrouw" is toegevoegd.

51) Ingangsklacht "Huidklachten/borstontsteking" is gewijzigd:

- Gerelateerde ingangsklacht "Kraamvrouw" is toegevoegd.

52) Ingangsklacht "Intoxicatie" is gewijzigd:

- *Info* is gewijzigd: "Denk aan de veiligheid voor de hulpverlener! Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): [www.vergiftigingen.info](http://www.vergiftigingen.info) of 088-7558000. Bij pijn ~~volwassenen meestal overdosis van alcohol, drugs of druk medicijnen;~~ thorax: bij selecteer kinderen ingangsklacht doorgaans 'Pijn/druk onbedoelde thorax' vergiftiging met medicijnen of andere middelen ."
- Bestaande voorwaarde voor urgentiecategorie verwijderd:
  - o advies 'U2'
  - o voor triagetype 'Alle'
  - o en 'Alcohol of drugs' = 'Ja'
  - o en 'Ernst pijn/druk thorax' >= 'Matig (5-7)'
- Bestaande voorwaarde voor urgentiecategorie verwijderd:

- advies 'U1'
- voor triagetype 'Alle'
- en 'Cocainegebruik' = 'Ja'
- en 'Ernst pijn/druk thorax' >= 'Licht (<4)'
- Gerelateerde ingangsklacht "Pijn/druk thorax" is toegevoegd.
- Dynamisch triagecriterium verwijderd: 'Ernst pijn/druk thorax' alleen tonen indien 'Alcohol of drugs' ≥ 'Ja'

53) Ingangsklacht "Koorts volwassene" is gewijzigd:

- *Info* is gewijzigd: "Temperatuur >38°C ~~>38~~ vanaf de leeftijd van 12 jaar. Bij (mogelijk) zwanger: trieer met de desbetreffende zwangerschapsingangsklacht. Indien maximaal 6 weken geleden bevallen: selecteer 'Kraamvrouw'. "
- Gerelateerde ingangsklacht "Kraamvrouw" is toegevoegd.

54) Ingangsklacht "Kortademig" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor urgentiecategorie toegevoegd:
  - advies 'U1'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Shockverschijnselen' >= 'Ja'
- Nieuwe voorwaarde voor urgentiecategorie toegevoegd:
  - advies 'U2'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Shockverschijnselen' >= 'Voorbij'

55) Ingangsklacht "Oogklachten" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor urgentiecategorie toegevoegd:
  - advies 'U1'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Acute visusdaling' >= 'Uitval (deel) gezichtsveld <12 uur'
- Nieuwe voorwaarde voor urgentiecategorie toegevoegd:
  - advies 'U3'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Acute visusdaling' >= 'Uitval (deel) gezichtsveld voorbij'
- Bij voorwaarden voor urgentiecategorie met advies 'U2' voor triagetype 'Alle' (id 697) triagecriterium gewijzigd naar 'Acute visusdaling' >= 'Uitval (deel) gezichtsveld >12 uur' (was 'Acute visusdaling' >= 'Uitval (deel) gezichtsveld')
- Nieuwe voorwaarde voor advies vervolgactie toegevoegd:
  - advies 'HA'
  - en 'Acute visusdaling' = 'Uitval (deel) gezichtsveld >12 uur'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Contactadvies oogklachten'
  - indien 'U3'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Hooikoorts'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Hooikoorts'

- indien 'U4'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Klachten na oog-OK of laserbehandeling of injectie <4 wkn'
  - indien 'U4'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Klachten na oog-OK of laserbehandeling of injectie <4 wkn'
  - indien 'U5'
- Bij voorwaarden voor weergave advies 'Contactadvies oogklachten hoogurgent' (id 1769) triagecriterium gewijzigd naar "Acute visusdaling' >= 'Uitval (deel) gezichtsveld >12 uur" (was "Acute visusdaling' >= 'Uitval (deel) gezichtsveld")

56) Ingangsklacht "Oorklachten" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Contactadvies loopoor'
  - en 'Loopoor' >= 'Korter dan 1 wk'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Contactadvies loopoor'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Contactadvies loopoor'
  - indien 'U4'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Doofheid, subacuut'
  - indien 'U5'

57) Ingangsklacht "Overlijden" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Verhanging'
  - en 'Twijfel' >= 'Ja'

58) Ingangsklacht "Pijn/druk thorax" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor urgentiecategorie toegevoegd:
  - advies 'U1'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Kleur' >= 'Bleek'
  - en 'Zweten' >= 'Ja'
- Nieuwe voorwaarde voor urgentiecategorie toegevoegd:
  - advies 'U2'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Urgentieverhogende factoren' >= 'Ja'
  - en 'Zweten' >= 'Ja'
- Nieuwe voorwaarde voor urgentiecategorie toegevoegd:
  - advies 'U2'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Urgentieverhogende factoren' >= 'Ja'
  - en 'Beklemmend/drukkend karakter' >= 'Ja'
- Nieuwe voorwaarde voor urgentiecategorie toegevoegd:

- advies 'U2'
- voor triagetype 'Alle'
- en 'Urgentieverhogende factoren' >= 'Ja'
- en 'Typische uitstraling' >= 'Ja'
- Bestaande voorwaarde voor urgentiecategorie verwijderd:
  - advies 'U2'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Zweten' >= 'Ja'
  - en 'Acute hartdood 1e graad <50 jaar' >= 'Ja'
- Bestaande voorwaarde voor urgentiecategorie verwijderd:
  - advies 'U2'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Beklemmend/drukkend karakter' >= 'Ja'
  - en 'Acute hartdood 1e graad <50 jaar' >= 'Ja'
- Bestaande voorwaarde voor urgentiecategorie verwijderd:
  - advies 'U2'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Typische uitstraling' >= 'Ja'
  - en 'Acute hartdood 1e graad <50 jaar' >= 'Ja'
- Bestaande voorwaarde voor urgentiecategorie verwijderd:
  - advies 'U1'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Cocainegebruik' >= 'Ja'
- Nieuwe voorwaarde voor advies vervolgactie toegevoegd:
  - advies 'AMBU'
  - en 'Urgentieverhogende factoren' >= 'Ja'
- Bestaand dynamisch triagecriterium gewijzigd naar 'Urgentieverhogende factoren' (was 'Acute hartdood 1e graad <50 jaar') alleen tonen indien
- Bestaand dynamisch triagecriterium gewijzigd naar 'Urgentieverhogende factoren' (was 'Acute hartdood 1e graad <50 jaar') alleen tonen indien
- Bestaand dynamisch triagecriterium gewijzigd naar 'Urgentieverhogende factoren' (was 'Acute hartdood 1e graad <50 jaar') alleen tonen indien

59) Ingangsklacht "Rugpijn" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor urgentiecategorie toegevoegd:
  - advies 'U1'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Ontstaan buik-/rugpijn' >= 'Per acuut hevig met excessief zweten'
- Nieuwe voorwaarde voor urgentiecategorie toegevoegd:
  - advies 'U1'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Kleur' >= 'Gruw'
  - en 'Rugpijn' >= 'Hevig (8-10) onderin de rug'

60) Ingangsklacht "Trauma buik" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor urgentiecategorie toegevoegd:
  - advies 'U2'
  - voor triagetype 'Alle'

- en 'Stomp-buiktrauma bij zwangerschap' >= 'Ja'
- Nieuwe voorwaarde voor advies vervolgactie toegevoegd:
  - advies 'VLK behandelaar'
  - en 'Stomp-buiktrauma bij zwangerschap' >= 'Ja'

61) Ingangsklacht "Trauma extremiteit" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor urgentiecategorie toegevoegd:
  - advies 'U2'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Stomp-buiktrauma bij zwangerschap' >= 'Ja'
- Nieuwe voorwaarde voor advies vervolgactie toegevoegd:
  - advies 'VLK behandelaar'
  - en 'Stomp-buiktrauma bij zwangerschap' >= 'Ja'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Trauma vinger/teen'
  - en 'Amputatieletsel' = 'Amputatie vinger of teen'

62) Ingangsklacht "Trauma hals" is gewijzigd:

- *Trauma* is gewijzigd van "Nee" naar "Ja"

63) Ingangsklacht "Trauma rug" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor urgentiecategorie toegevoegd:
  - advies 'U2'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Stomp-buiktrauma bij zwangerschap' >= 'Ja'
- Nieuwe voorwaarde voor advies vervolgactie toegevoegd:
  - advies 'VLK behandelaar'
  - en 'Stomp-buiktrauma bij zwangerschap' >= 'Ja'

64) Ingangsklacht "Trauma schedel" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor urgentiecategorie toegevoegd:
  - advies 'U3'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Amnesie, anterograad ' >= 'Ja'
- Nieuwe voorwaarde voor urgentiecategorie toegevoegd:
  - advies 'U2'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Stomp-buiktrauma bij zwangerschap' >= 'Ja'
- Bestaande voorwaarde voor urgentiecategorie verwijderd:
  - advies 'U1'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Vocht of bloed uit oor' >= 'Ja'
- Bestaande voorwaarde voor urgentiecategorie verwijderd:
  - advies 'U2'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Amnesie, anterograad ' >= 'Langer dan 4 uur'

- Bij voorwaarden voor urgentiecategorie met advies 'U3' voor triagetype 'Alle' (id 342) triagecriterium gewijzigd naar '65 jaar of ouder' = 'Ja' (was '60 jaar of ouder' = 'Ja')
- Bestaande voorwaarde voor urgentiecategorie verwijderd:
  - advies 'U3'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Amnesie, anterograad' = 'Korter dan 4 uur'
- Nieuwe voorwaarde voor advies vervolgactie toegevoegd:
  - advies 'HA'
  - en 'Stolling afwijkend bij trauma' >= 'Onbekend'
- Nieuwe voorwaarde voor advies vervolgactie toegevoegd:
  - advies 'VLK behandelaar'
  - en 'Stomp-buiktrauma bij zwangerschap' >= 'Ja'

65) Ingangsklacht "Trauma thorax" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor urgentiecategorie toegevoegd:
  - advies 'U2'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Stomp-buiktrauma bij zwangerschap' >= 'Ja'
- Nieuwe voorwaarde voor advies vervolgactie toegevoegd:
  - advies 'VLK behandelaar'
  - en 'Stomp-buiktrauma bij zwangerschap' >= 'Ja'

66) Ingangsklacht "Urinewegproblemen" is gewijzigd:

- *Info* is gewijzigd: "Vaak plassen, pijn bij het plassen, bloed in de urine, niet kunnen plassen. Dus urineweginfectie, hematurie of urineretentie. ~~Indien (mogelijk) zwanger: voeg ook de passende zwangerschapsingangsklacht toe.~~ Indien (mogelijk) zwanger: voeg ook de passende zwangerschapsingangsklacht toe. Indien maximaal 6 weken geleden bevallen: selecteer 'Kraamvrouw'. "
- Gerelateerde ingangsklacht "Kraamvrouw" is toegevoegd.

67) Ingangsklacht "Vaginaal bloedverlies" is gewijzigd:

- *Info* is gewijzigd: "Abnormaal vaginaal bloedverlies zonder trauma. ~~Indien (mogelijk) zwanger: selecteer 'Zwangerschap en vaginaal bloedverlies'.~~ Indien (mogelijk) zwanger: selecteer 'Zwangerschap en vaginaal bloedverlies'. Indien maximaal 6 weken geleden bevallen: selecteer 'Kraamvrouw'. "
- Nieuwe voorwaarde voor urgentiecategorie toegevoegd:
  - advies 'U1'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Vaginaal bloedverlies' >= 'Hevig'
  - en 'Shockverschijnselen' >= 'Ja'
- Nieuwe voorwaarde voor urgentiecategorie toegevoegd:
  - advies 'U2'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Vaginaal bloedverlies' >= 'Hevig'
- Bij voorwaarden voor urgentiecategorie met advies 'U3' voor triagetype 'Alle' (id 564) triagecriterium gewijzigd naar 'Vaginaal bloedverlies' >= 'Ruim' (was 'Vaginaal bloedverlies' >= 'Hevig')

- Gerelateerde ingangsklacht "Kraamvrouw" is toegevoegd.

68) Ingangsklacht "Vreemd gedrag of suïcidaal" is gewijzigd:

- *Info* is gewijzigd: "(Zeer) vreemd gedrag is recent veranderd gedrag dat anders is dan normaal en te onderscheiden van dronken, zoals wanen, hallucinaties, onsamenhangend, gefragmenteerd gedrag, warrig praten, aandachtsproblemen, opgewonden, onrustig of juist stil en teruggetrokken gedrag. Bij agressief gedrag: zorg voor de veiligheid van de omstanders. Schakel desnoods en zeker bij ogenblikkelijk risico (springen, ophangen, verdrinken) direct de politie in. Bij verdenking intoxicatie: kies ingangsklacht 'Intoxicatie'. Indien maximaal 6 weken geleden bevallen: selecteer 'Kraamvrouw'. "
- Gerelateerde ingangsklacht "Kraamvrouw" is toegevoegd.

69) Ingangsklacht "Wond" is gewijzigd:

- *Info* is gewijzigd: "Bijt-wond of letsel van de huid. Kies zo nodig een gerelateerde trauma-ingangsklacht. Indien post partum perineum- of sectiowond: selecteer 'Kraamvrouw'. "
- Nieuwe voorwaarde voor urgentie categorie toegevoegd:
  - advies 'U4'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Tetanusindicatie' >= 'Ja'
- Nieuwe voorwaarde voor urgentie categorie toegevoegd:
  - advies 'U3'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Zieke indruk volwassene' >= 'Ja'
- Nieuwe voorwaarde voor urgentie categorie toegevoegd:
  - advies 'U3'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Zieke indruk kind' >= 'Ja'
- Bestaande voorwaarde voor urgentie categorie verwijderd:
  - advies 'U3'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Tetanusindicatie' = 'Tetanusprofylaxe TIG'
- Bestaande voorwaarde voor urgentie categorie verwijderd:
  - advies 'U4'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Tetanusindicatie' = 'Tetanustoxoïd'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Trauma vinger/teen'
  - indien 'U2'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Trauma vinger/teen'
  - indien 'U3'
- Gerelateerde ingangsklacht "Kraamvrouw" is toegevoegd.

70) Ingangsklacht "Ziek kind / koorts kind" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor urgentie categorie toegevoegd:

- advies 'U3'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Baby' >= '3 mnd - 1 wk'
  - en 'Hele voeding teruggeven' >= 'Ja, langer dan 1 dag'
- Bestaande voorwaarden voor urgentiecategorie gewijzigd:
  - voor triagetype 'Alle' (was 'Telefonisch')
  - en 'Baby' >= '12 - 6 mnd'
  - en 'Hele voeding teruggeven' >= 'Ja, korter dan 1 dag'
  - en 'Diarree' >= 'Ja'
- Bestaande voorwaarden voor urgentiecategorie gewijzigd:
  - voor triagetype 'Alle' (was 'Telefonisch')
  - en 'Baby' >= '12 - 6 mnd'
  - en 'Hele voeding teruggeven' >= 'Ja, langer dan 1 dag'
- Bestaande voorwaarden voor urgentiecategorie gewijzigd:
  - voor triagetype 'Alle' (was 'Telefonisch')
  - en 'Nog nooit ontlasting gehad' >= 'Ja, nooit'
  - en 'Baby' >= '< 1 wk'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Contactadvies koorts kind hoogurgent'
  - indien 'U1'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Contactadvies koorts kind hoogurgent'
  - indien 'U2'

71) Ingangsklacht "Zwangerschap en bezorgdheid" is gewijzigd:

- *Naam* is gewijzigd van "Zwangerschap en bezorgdheid" naar "Zwangerschap en niet-somatische klachten"
- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "12 jaar" naar "10 jaar"
- *Relevant tot* is gewijzigd van "50 jaar" naar "55 jaar"
- Locatie "Buik" is toegevoegd
- Locatie "Hoofd" is toegevoegd

72) Ingangsklacht "Zwangerschap en buikpijn" is gewijzigd:

- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "12 jaar" naar "10 jaar"
- *Relevant tot* is gewijzigd van "50 jaar" naar "55 jaar"
- Nieuwe voorwaarde voor urgentiecategorie toegevoegd:
  - advies 'U2'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Vaginaal bloedverlies' >= 'Matig'
  - en 'Zwangerschapsduur' >= '16 t/m 23+4 wkn'
- Nieuwe voorwaarde voor urgentiecategorie toegevoegd:
  - advies 'U3'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Maagpijn' >= 'Ja'
- Nieuwe voorwaarde voor urgentiecategorie toegevoegd:
  - advies 'U3'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Vaginaal bloedverlies' >= 'Ruim'

- Nieuwe voorwaarde voor urgentiecategorie toegevoegd:
  - advies 'U3'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Vaginaal bloedverlies' >= 'Gering'
  - en 'Zwangerschapsduur' >= '16 t/m 23+4 wkn'
- Bij voorwaarden voor urgentiecategorie met advies 'U1' voor triagetype 'Alle' (id 750) het triagecriterium 'Buikpijn bij zwangerschap' >= 'Hevig (8-10), geen weeën' toegevoegd
- Bij voorwaarden voor urgentiecategorie met advies 'U1' voor triagetype 'Alle' (id 750) het triagecriterium 'Pijn' >= 'Hevig (8-10)' verwijderd
- Bij voorwaarden voor urgentiecategorie met advies 'U2' voor triagetype 'Alle' (id 754) het triagecriterium 'Buikpijn bij zwangerschap' >= 'Hevig (8-10), geen weeën' toegevoegd
- Bij voorwaarden voor urgentiecategorie met advies 'U2' voor triagetype 'Alle' (id 754) het triagecriterium 'Pijn' >= 'Hevig (8-10)' verwijderd
- Bij voorwaarden voor urgentiecategorie met advies 'U2' voor triagetype 'Alle' (id 755) het triagecriterium 'Zwangerschapsduur' >= '23+5 t/m 33+6 wkn' toegevoegd
- Bij voorwaarden voor urgentiecategorie met advies 'U2' voor triagetype 'Alle' (id 758) triagecriterium gewijzigd naar 'Maagpijn' >= 'Ja, met braken/bovenbuikspijn' (was 'Maagpijn + braken/bovenbuikspijn' >= 'Ja')
- Bestaande voorwaarden voor urgentiecategorie gewijzigd:
  - advies 'U4' (was 'U2')
  - en 'Vaginaal bloedverlies' >= 'Matig'
- Bij voorwaarden voor urgentiecategorie met advies 'U2' voor triagetype 'Alle' (id 761) het triagecriterium 'Buikpijn bij zwangerschap' >= 'Ja, matig (5-7), geen weeën' toegevoegd
- Bij voorwaarden voor urgentiecategorie met advies 'U2' voor triagetype 'Alle' (id 761) het triagecriterium 'Pijn' >= 'Ja (5-7)' verwijderd
- Bij voorwaarden voor urgentiecategorie met advies 'U3' voor triagetype 'Alle' (id 764) het triagecriterium 'Buikpijn bij zwangerschap' >= 'Ja, matig (5-7), geen weeën' toegevoegd
- Bij voorwaarden voor urgentiecategorie met advies 'U3' voor triagetype 'Alle' (id 764) het triagecriterium 'Pijn' >= 'Ja (5-7)' verwijderd
- Bij voorwaarden voor urgentiecategorie met advies 'U3' voor triagetype 'Alle' (id 764) het triagecriterium 'Zwangerschapsduur' <= '16 t/m 23+4 wkn' verwijderd
- Bestaande voorwaarde voor urgentiecategorie verwijderd:
  - advies 'U3'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Vaginaal bloedverlies' >= 'Gering'
- Bij voorwaarden voor urgentiecategorie met advies 'U3' voor triagetype 'Alle' (id 769) triagecriterium gewijzigd naar 'Diarree' >= 'Waterdun, frequent, langer dan 3 dagen' (was 'Diarree' >= 'Ja')
- Bij voorwaarden voor urgentiecategorie met advies 'U1' voor triagetype 'Alle' (id 850) triagecriterium gewijzigd naar 'Vaginaal bloedverlies' >= 'Ruim' (was 'Vaginaal bloedverlies' >= 'Matig')
- Bij voorwaarden voor urgentiecategorie met advies 'U1' voor triagetype 'Alle' (id 851) het triagecriterium 'Buikpijn bij zwangerschap' >= 'Ja, matig (5-7), geen weeën' toegevoegd
- Bij voorwaarden voor urgentiecategorie met advies 'U1' voor triagetype 'Alle' (id 851) het triagecriterium 'Pijn' >= 'Ja (5-7)' verwijderd

- Bestaande voorwaarden voor urgentiecategorie gewijzigd:
  - advies 'U2' (was 'U3')
  - en 'Harde buiken'  $\geq$  'Ja, met regelmaat'
  - en 'Zwangerschapsduur' = '23+5 t/m 33+6 wkn'
- Bij voorwaarden voor weergave advies 'Stabiele zijligging, zwanger' (id 1822) triagecriterium gewijzigd naar "Vaginaal bloedverlies"  $\geq$  'Ruim' (was "Vaginaal bloedverlies"  $\geq$  'Matig')
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Uitgezakte delen'
  - en 'Vermoeden uitgezakte delen'  $\geq$  '>16 wkn'
- Bij voorwaarden voor weergave advies 'Zwangerschap, hevige pijn' (id 1881) triagecriterium gewijzigd naar "Buikpijn bij zwangerschap"  $\geq$  'Hevig (8-10), geen weeën' (was "Pijn"  $\geq$  'Hevig (8-10)')
- Bestaand dynamisch triagecriterium gewijzigd naar alleen tonen indien 'Pijn'  $\geq$  'Ja (5-7)' (was 'Buikpijn bij zwangerschap'  $\geq$  'Ja, matig (5-7), geen weeën')
- Bestaand dynamisch triagecriterium gewijzigd naar alleen tonen indien 'Vaginaal bloedverlies'  $\geq$  'Matig' (was 'Vaginaal bloedverlies'  $\geq$  'Ruim')

73) Ingangsklacht "Zwangerschap en overige klachten" is gewijzigd:

- *Naam* is gewijzigd van "Zwangerschap en overige klachten" naar "Zwangerschap en overige somatische klachten"
- *Info* is gewijzigd: "Deze ingangsklacht alleen gebruiken bij bekende of niet-vestigde zwangerschap in combinatie met: hoofdpijn ~~insulthoofdpijn~~ + visusklachten/tintelingendiabetes + diarree/brakenmaagpijnaanhoudende diarree/brakenmaagpijn hoofdpijnstomp-buiktraumaHET + ~~braken/bovenbuikspijnstomp-buiktraumaHET~~ (hoogenergetisch trauma) jeuk aan de handpalmen/voetzolenmictieklachtenverminderde kindsbewegingpijnlijk been met roodheid en/of zwelling ~~handpalmen/voetzolenmictieklachten~~. Voor alle overige klachten: selecteer de passende ingangsklacht. "
- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "12 jaar" naar "10 jaar"
- *Relevant tot* is gewijzigd van "50 jaar" naar "55 jaar"
- Locatie "Buik" is toegevoegd
- Locatie "Hoofd" is toegevoegd
- Locatie "Extremiteit (arm/been)" is toegevoegd
- Nieuwe voorwaarde voor urgentiecategorie toegevoegd:
  - advies 'U2'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Pijnlijk been met roodheid/zwelling'  $\geq$  'Ja'
- Nieuwe voorwaarde voor urgentiecategorie toegevoegd:
  - advies 'U2'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Verminderde kindsbewegingen'  $\geq$  'Ja'
  - en 'Zwangerschapsduur'  $\geq$  '23+5 t/m 33+6 wkn'
- Nieuwe voorwaarde voor urgentiecategorie toegevoegd:
  - advies 'U3'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Aanhoudende hoofdpijn bij zwangerschap'  $\geq$  'Ja'
- Nieuwe voorwaarde voor urgentiecategorie toegevoegd:
  - advies 'U3'

- voor triagetype 'Alle'
  - en 'Maagpijn' >= 'Ja'
- Bestaande voorwaarde voor urgentie categorie verwijderd:
  - advies 'U1'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Insult bij zwangerschap' >= 'Ja'
- Bij voorwaarden voor urgentie categorie met advies 'U2' voor triagetype 'Alle' (id 788) triagecriterium gewijzigd naar 'Maagpijn' >= 'Ja, met braken/bovenbuikspijn' (was 'Maagpijn + braken/bovenbuikspijn' >= 'Ja')
- Bestaande voorwaarde voor urgentie categorie verwijderd:
  - advies 'U3'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Verandering bloedverlies kraamvrouw' >= 'Ja'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Zwangerschap, insult'
  - en 'Insult bij zwangerschap' >= 'Ja'
- Nieuw dynamisch triagecriterium toegevoegd: 'Zwangerschapsduur' alleen tonen indien 'Verminderde kindsbewegingen' ≥ 'Ja'

74) Ingangsklacht "Zwangerschap en partus" is gewijzigd:

- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "12 jaar" naar "10 jaar"
- *Relevant tot* is gewijzigd van "50 jaar" naar "55 jaar"
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Partus instructie'
  - indien 'U1'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Partus'
  - indien 'U1'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Partus, met intacte vliezen '
  - indien 'U1'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Partus, uitgezakte navelstreng'
  - indien 'U1'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Partus, liggingsafwijking'
  - indien 'U1'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Partus, baby geboren'
  - indien 'U1'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Partus, baby huult niet '
  - indien 'U1'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Partus, continue hevige buikpijn'
  - indien 'U1'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Partus, fors vaginaal bloedverlies'
  - indien 'U1'

- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Partus, insult'
  - indien 'U1'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Partus, geboorte placenta'
  - indien 'U1'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Partus, navelstreng om nek'
  - indien 'U1'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Partus, stuitligging'
  - indien 'U1'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Partus, vaginaal bloedverlies bij placenta praevia'
  - indien 'U1'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Partus, baby geboren <28 weken'
  - indien 'U1'

75) Ingangsklacht "Zwangerschap en vaginaal bloedverlies" is gewijzigd:

- *Info* is gewijzigd: "Vaginaal bloedverlies bij bekende of niet-vastgestelde zwangerschap. Indien trauma: voeg ook de passende trauma-ingangsklacht toe. ~~Bloedverlies bij de kraamvrouw ook via deze ingangsklacht triëren.~~ "
- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "12 jaar" naar "10 jaar"
- *Relevant tot* is gewijzigd van "50 jaar" naar "55 jaar"
- Nieuwe voorwaarde voor urgentie categorie toegevoegd:
  - advies 'U2'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Vaginaal bloedverlies' >= 'Matig'
  - en 'Zwangerschapsduur' >= '16 t/m 23+4 wkn'
- Nieuwe voorwaarde voor urgentie categorie toegevoegd:
  - advies 'U4'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Vaginaal bloedverlies' >= 'Matig'
- Nieuwe voorwaarde voor urgentie categorie toegevoegd:
  - advies 'U3'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Vaginaal bloedverlies' >= 'Ruim'
- Bestaande voorwaarde voor urgentie categorie verwijderd:
  - advies 'U2'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Vaginaal bloedverlies' >= 'Matig'
- Bij voorwaarden voor urgentie categorie met advies 'U1' voor triagetype 'Alle' (id 853) triagecriterium gewijzigd naar 'Vaginaal bloedverlies' >= 'Ruim' (was 'Vaginaal bloedverlies' >= 'Matig')
- Bestaande voorwaarde voor urgentie categorie verwijderd:
  - advies 'U3'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Verandering bloedverlies kraamvrouw' >= 'Ja'

- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Vaginaal bloedverlies bij placenta praevia'
  - en 'Placenta praevia' >= 'Ja'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Uitgezakte delen'
  - en 'Vermoeden uitgezakte delen' >= '>16 wkn'
- Bij voorwaarden voor weergave advies 'Stabiele zijligging, zwanger' (id 1830) triagecriterium gewijzigd naar "Vaginaal bloedverlies" >= 'Ruim' (was "Vaginaal bloedverlies" >= 'Matig')
- Bestaand dynamisch triagecriterium gewijzigd naar alleen tonen indien 'Vaginaal bloedverlies' ≥ 'Matig' (was 'Vaginaal bloedverlies' ≥ 'Ruim')

76) Ingangsklacht "Zwangerschap en vochtverlies" is gewijzigd:

- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "12 jaar" naar "10 jaar"
- *Relevant tot* is gewijzigd van "50 jaar" naar "55 jaar"
- Nieuwe voorwaarde voor urgentie categorie toegevoegd:
  - advies 'U3'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Vermoeden gebroken vliezen >24 uur' >= 'Ja'
- Bestaande voorwaarde voor urgentie categorie verwijderd:
  - advies 'U1'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Vaginaal bloedverlies' >= 'Matig'
  - en 'Vegetatieve verschijnselen' >= 'Ja'
- Bestaande voorwaarde voor urgentie categorie verwijderd:
  - advies 'U1'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Vaginaal bloedverlies' >= 'Hevig'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Stabiele zijligging, zwanger'
  - en 'Vaginaal bloedverlies' >= 'Matig'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Uitgezakte delen'
  - en 'Vermoeden uitgezakte delen' >= '>16 wkn'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Zwangerschap, hevig vaginaal bloedverlies'
  - en 'Vaginaal bloedverlies' >= 'Hevig'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Zwangerschap, hevige pijn'
  - en 'Pijn' >= 'Hevig (8-10)'
- Nieuw dynamisch triagecriterium toegevoegd: 'Vermoeden uitgezakte delen' alleen tonen indien 'Vochtverlies' ≥ 'Kleurloos'
- Dynamisch triagecriterium verwijderd: 'Vegetatieve verschijnselen' alleen tonen indien 'Vaginaal bloedverlies' ≥ 'Matig'

## Locaties

Er zijn geen wijzigingen.

# Redenen afbreken triage

77) RedenAfbrekenTriage "Palliatieve zorg" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "**Terminale Palliatieve** zorg"

## Triagecriteria

78) Triagecriterium "65 jaar of ouder" is toegevoegd.

79) Triagecriterium "Aanhoudende hoofdpijn bij zwangerschap" is toegevoegd.

80) Triagecriterium "Geplast binnen 6 uur post partum" is toegevoegd.

81) Triagecriterium "Hoofdpijn die niet reageert op pijnstilling" is toegevoegd.

82) Triagecriterium "Koorts post partum" is toegevoegd.

83) Triagecriterium "Oedeem in gezicht en handen/voeten" is toegevoegd.

84) Triagecriterium "Ontstaan buik-/rugpijn" is toegevoegd.

85) Triagecriterium "Pijn aan wond na partus" is toegevoegd.

86) Triagecriterium "Pijnlijk been met roodheid/zwelling" is toegevoegd.

87) Triagecriterium "Stinkende afscheiding met buikpijn" is toegevoegd.

88) Triagecriterium "Type diabetes" is toegevoegd.

89) Triagecriterium "Urgentieverhogende factoren" is toegevoegd.

90) Triagecriterium "Vermoeden gebroken vliezen >24 uur" is toegevoegd.

91) Triagecriterium "55 jaar of ouder" is gewijzigd:

- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "" naar "55 jaar"

92) Triagecriterium "Acute visusdaling" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "**Uitval (deel) gezichtsveld is verdacht voor neurologisch probleem.** Wazig zien i.c.m. braken en pijn kan op glaucoom wijzen. **Verdacht voor neurologisch probleem bij uitval gedeelte gezichtsveld.**"
- Antwoorden zijn gewijzigd

93) Triagecriterium "Afwijkende ligging" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Elke andere ligging van de foetus dan hoofdligging. Voorbeelden zijn stuitligging of dwarsligging. "

94) Triagecriterium "Amnesie, anterograad " is gewijzigd:

- *Ondersteuningsvragen* is gewijzigd: "Is er sprake van geheugenverlies van na het ongeval? ~~Hoe groot is het gat in het geheugen?~~ "
- Antwoorden zijn gewijzigd

95) Triagecriterium "AVPU" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "A = Alerte ~~alerte reactie,~~ V = ~~reactie op aanspreken,~~ P = ~~reactie op schudden of pijn,~~ U = ~~unresponsive en bewusteloos~~ V Kind: = een Reactie kind op dat ander gedrag vertoont welke de ouder niet herkent (suf, ijlen) scoort een V. Zeer aanspreken alarmerend is een kind dat apathisch (te rustig!) is na een periode met forse kortademigheid (= V). P = Reactie op schudden of pijn U = Unresponsive en bewusteloos Kind: een kind dat ander gedrag vertoont welke de ouder niet herkent (suf, ijlen), scoort een V. Zeer alarmerend is een kind dat apathisch (te rustig!) is na een periode van forse kortademigheid (is V). "
- *Ondersteuningsvragen* is gewijzigd: "NL Volwassene: Is de patiënt alert? ~~alert,~~ Reageert reageert hij op aanspreken? ~~aanspreken~~ Reageert dan hij wel op schudden? ~~schudden of~~ Is is hij bewusteloos? NL Kind: Krijgt krijgt u contact met uw kind? ~~kind,~~ Herkent herkent u dit gedrag? EN Volwassene: Is the patient awake? ~~awake,~~ Does does he respond to being spoken to? ~~Does he to respond or~~ to being shaken? ~~shaken,~~ Is or is he unconscious? EN Kind: Is your child responding to you? ~~you,~~ Do do you recognize this behavior? DU Volwassene: Ist der Patient aufmerksam? Reagiert er auf ansprechen? Reagiert er auf rütteln? Ist er bewusstlos? DU Kind: Reagiert ihr Kind auf Sie? Kennen sie dieses Verhalten? "

96) Triagecriterium "Baby" is gewijzigd:

- Antwoorden zijn gewijzigd

97) Triagecriterium "Bezorgdheid zwangerschap" is gewijzigd:

- *Naam* is gewijzigd van "Bezorgdheid zwangerschap" naar "Abnormaal ongerust"
- *Omschrijving* is gewijzigd: "De vrouw of haar partner maakt zich meer zorgen dan normaal over zaken gerelateerd aan de zwangerschap en/of bevalling. Bijvoorbeeld: heeft in het verleden ziekte doorgemaakt heeft belaste verloskundige voorgeschiedenis, bijvoorbeeld keizersnede, vroeggeboorte of doodgeboorte heeft bestaande afwijking die voor de huidige situatie van belang is; zowel psychisch, algemeen als verloskundig heeft last van omgevingsfactor(en) zoals drugsmisbruik, armoede, werkeloosheid, mishandeling, alleenstaand, depressie en/of andere psychiatrische problemen ongerust door bijvoorbeeld iets dat de vrouw in de krant gelezen heeft, op televisie gezien heeft of van anderen gehoord heeft. "

98) Triagecriterium "Brandwond, locatie" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "~~Perineum is de huid tussen anus en uitwendige geslachtsorganen. Verbranding van ogen en oren kan invaliderende littekens of~~

~~verminderingen veroorzaken. Denk ook aan inhalatietrauma.~~ Een brandwond betreft een beschadigde huid, dus ten minste een blaas. Geen zonverbranding. Verbranding van ogen en oren kan invaliderende littekens of verminkingen veroorzaken. Mond: let op dat er geen sprake is van een bedreigde ademweg door inhalatietrauma of een zwelling. Perineum is de huid tussen anus en uitwendige geslachtsorganen. Circulair: verbranding rondom een lichaamsdeel waardoor de doorbloeding wordt bedreigd. "

- *Ondersteuningsvragen* is gewijzigd: "Welk lichaamsdeel is verbrand (oog, oor, mond gelaat), perineum, rondom gewricht, circulair)?"
- Antwoorden zijn gewijzigd

99) Triagecriterium "Corpus alienum ingeslikt/ingeademd" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Gevaarlijk Gevaarlijk is bijvoorbeeld: batterijknoopcelbatterijscherp voorwerp/rand2 of meer magnetenmagneet in combinatie met een andere metalen corpus alienumvoorwerpen met diameter >2,5 cm voorwerpen met lengte >6 cm "

100) Triagecriterium "Doorboord" is gewijzigd:

- *Ondersteuningsvragen* is gewijzigd: "Is er een wond? Waardoor veroorzaakt? Hoe veroorzaakt?Hoe diep? Zit het voorwerp er nog in? "

101) Triagecriterium "Dreigende dehydratie" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Jonger dan 2 jaar of ouder dan 70 jaar Aanwijzingen voor dreigende dehydratie: 1 dag frequente (>6dd) waterdunne diarree 1 dag waterdunne diarree en koorts 1 dag frequent braken koorts .2 - 70 jaar Aanwijzingen voor dreigende dehydratie: 3 dagen frequente (>6 dd) waterdunne diarree waterdunne diarree en 3 dagen koortsfrequente waterdunne diarree met minimale vochtopname en opvallende dorst. "
- *Ondersteuningsvragen* is gewijzigd: "Is er diarree? Sinds wanneer? Hoe vaak lang per en dag? hoe vaak? Hoe dun is de diarree? Is er koorts? Braakt u? Sinds wanneer? Hoe vaak per dag? "

102) Triagecriterium "Gedrag" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Voorbeelden van zeer vreemd/bizar gedrag: WanenHallucinatiesVreemde houdingen (katatonie)Zeer vreemde communicatieErnstig, inadequaar stilzwijgenOnsamenhangend, gefragmenteerd gedrag.Voorbeelden van vreemd gedrag: Verward, praat vaak warrig, kan aandacht er niet bij houdenStoornis in oriëntatie (plaats/tijd)Anders houdenAnders dan gewend; opgewonden, onrustig of juist stil en teruggetrokken "

103) Triagecriterium "Glucose" is gewijzigd:

- Antwoorden zijn gewijzigd

104) Triagecriterium "Koorts" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Koorts is  $>38^{\circ}\text{C}$   $>38^{\circ}\text{C}$ . Rectaal gemeten is het meest betrouwbaar .—" "

105) Triagecriterium "Maagpijn + braken/bovenbuikspijn" is gewijzigd:

- *Naam* is gewijzigd van "Maagpijn + braken/bovenbuikspijn" naar "Maagpijn"
- *Omschrijving* is gewijzigd: "Pijn Combinatie van pijn in de maagstreek. De combinatie met braken en/of met pijn boven in de buik (net onder de borsten); kan duiden Pijn boven in de buik: lijkt alsof er een band / riem aangetrokken is aan de bovenkant van de buik. Deze symptomen kunnen duiden op dreigende eclampsie of HELLP-syndroom. Bovenbuikspijn: lijkt alsof er een band/riem aangetrokken is aan de bovenkant van de buik. "
- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "12 jaar" naar "10 jaar"
- *Relevant tot* is gewijzigd van "" naar "55 jaar"
- Antwoorden zijn gewijzigd

106) Triagecriterium "Meebewegende vlekken" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Kleine pluisjes, puntjes of draadjes friemeltjes zijn niet ernstig. Een meebewegende vlek (of meerdere meebewegende vlekken) kan mogelijk ernstig zijn. \_ "
- *Ondersteuningsvragen* is gewijzigd: "Wat ziet u precies? Zijn het kleine pluisjes, puntjes of draadjes? Wanneer u naar 1 friemeltjes? punt Is kijkt, het beweegt een de meebewegende vlek dan mee of staat deze stil? vlekken? "

107) Triagecriterium "Mictieklachten kind" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Plasproblemen Pijn bij het plassen en vaak kleine beetjes. Ontsteking van de urinewegen wordt aangetoond door positieve nitriet of sediment of door zeer typische klachten. Koorts wijst op opstijging van de infectie naar de nieren. "
- *Ondersteuningsvragen* is gewijzigd: "Hoe vaak plast Doet het kind? Hoeveel? plassen Doet zeer; het frequent plassen plassen? pijn? "

108) Triagecriterium "Mictieklachten man" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Plasproblemen Pijn bij het plassen en vaak kleine beetjes. Ontsteking van de urinewegen wordt aangetoond door positieve nitriet of sediment of door zeer typische klachten. Koorts wijst op opstijging van de infectie naar de nieren. "
- *Ondersteuningsvragen* is gewijzigd: "Hoe vaak plast u? Hoeveel plast u? Doet het plassen pijn? zeer; frequent plassen? "

109) Triagecriterium "Mictieklachten vrouw" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Plasproblemen Pijn bij het plassen en vaak kleine beetjes. Ontsteking van de urinewegen wordt aangetoond door positieve nitriet of sediment of door zeer typische klachten. Koorts wijst op opstijging van de infectie naar de nieren. "

- *Ondersteuningsvragen* is gewijzigd: "Hoe vaak plast u? Hoeveel plast u? Doet het plassen pijn? zeer; frequent plassen? "

110) Triagecriterium "Ontsteking" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Pijn, zwelling, warmte en roodheid. ~~Een pussende infectie of abces is ook een ontsteking.~~ "

111) Triagecriterium "Oogletsel" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Doorboord oog: oog is ernstig ( ook metaalsplinters een metaalsplinter: komt voor bij werken met metaal op metaal → Corpus Gevoel alienum: dat er iets in het oog en/of kras op de oogbol door bijvoorbeeld een tak zit , vingernagel is of meestal krab een van corneaal een corpus kat alienum. Stomp trauma: klap Klap op het oog, ( met of zonder gesloten ooglid) ~~is stomp trauma~~ . "
- *Ondersteuningsvragen* is gewijzigd: "Wat heeft u in het oog gekregen? Bij mensen die met metaal op metaal werken: heeft u het gevoel dat u een harde klap tegen het oog kreeg? (Dan mogelijk een metaalsplinter in het oog.) Is er een verwonding aan het oog? Kunt u die beschrijven (waardoor veroorzaakt, kracht van het letsel, oog doorboord)? Heeft u het gevoel dat er nog iets in uw oog zit? ~~Bij mensen die met metaal op metaal werken: heeft u het gevoel dat u een harde klap tegen het oog kreeg? (Dan mogelijk een metaalsplinter in het oog.)~~ "

112) Triagecriterium "Pijn testis" is gewijzigd:

- *Ondersteuningsvragen* is gewijzigd: "Is er pijn in of aan de balzak? ~~Wat kunt u nog wel doen? Wat kunt u niet meer door de pijn?~~ "

113) Triagecriterium "Risico op ernstig letsel" is gewijzigd:

- Antwoorden zijn gewijzigd

114) Triagecriterium "Spugen" is gewijzigd:

- *Naam* is gewijzigd van "Spugen" naar "Hele voeding teruggeven"
- *Omschrijving* is gewijzigd: "Teruggeven van de gehele fles- en/of borstvoeding, of het Spugen grootste is gedeelte meer ervan, dan oprispen Kies 'Nee' bij slechts een mondje teruggeven. "
- *Ondersteuningsvragen* is gewijzigd: "Geeft de baby voeding het terug? kind Wanneer? over? Hoe vaak? Hoeveel? Wanneer is het begonnen? "

115) Triagecriterium "Sterk verminderde weerstand" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Sterk verminderd is verminderd is door immunosuppressie zoals cytostatica, HIV-remmers, methotrexaat en ziekte van Addison. "

116) Triagecriterium "Stomp-buiktrauma" is gewijzigd:

- *Naam* is gewijzigd van "Stomp-buiktrauma" naar "Stomp-buiktrauma bij zwangerschap"

- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "" naar "10 jaar"
- *Relevant tot* is gewijzigd van "" naar "55 jaar"
- *Relevant voor geslacht* is gewijzigd van "Mannen & vrouwen" naar "Vrouwen"

117) Triagecriterium "Tetanusindicatie" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Volgens RIVM-richtlijn bij iedere wond. Liefst zo snel mogelijk, maar binnen 3 ~~Booster weken~~ toxoid is kan ook de nog volgende zinvol. dag "
- Antwoorden zijn gewijzigd

118) Triagecriterium "Trauma" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Kies alleen 'HET nog ter plaatse' als: er sprake was van een hoogenergetisch ongeval, zoals:voetganger of fietser aangereden door voertuiguit voertuig geslingerd of voertuig over de kopongeluk met voertuig met hoge snelheid (>45 ~~>65~~ km/u)ernstige vervorming van voertuigongeval met dodelijk(e) slachtoffer(s)val van meer dan drie meter hoogteval/trap van een paardbeklemming/bedelvinghet slachtoffer direct na het ongeval nog op de ongevalslocatie is. Kies 'HET niet meer ter plaatse' als: - het slachtoffer de plek van het ongeval al heeft verlaten. Het toestandsbeeld en de specifieke klachten zijn dan leidend voor de urgentiebepaling, niet het ongevalsmechanisme. "

119) Triagecriterium "Trauma - fysieke triage" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Kijk naar het te verwachten letsel op basis van het ongevalsmechanisme! Bij een 'hoogenergetisch trauma' is er sprake van een hoge energieoverdracht die tot inwendig letsel kan leiden. Bijvoorbeeld: voetganger of fietser aangereden door voertuiguit voertuig geslingerd of voertuig over de kopongeluk met voertuig met hoge snelheid (>45 ~~>65~~ km/u)ernstige vervorming van voertuigongeval met dodelijk(e) slachtoffer(s)val van meer dan drie meter hoogteval/trap van een paardbeklemming/bedelving. "

120) Triagecriterium "Vaginaal bloedverlies" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Bloedverlies ~~Hevig: meer uit dan de of vagina gelijk zonder aan een vermenging kopje~~ bloedverlies (meer dan normale menstruatie) in een zeer korte tijd (5 minuten). Eventueel met grote stolsels (enkele cm groot) of een constante stroom van helder urine rood bloed. Bijv. 1 vol kraam- of maandverband in 5 minuten is hevig vaginaal bloedverlies . Hevig: Matig: minder continue dan stroom een van kopje helder bloedverlies rood (net zoveel bloed, als normale menstruatie) of in met korte veel tijd stolsels (20 gepaard minuten), gaand Groter bloedverlies dan een 2-euro-muntstuk . Indicatie: Bijv. één 4 vol maand-/kraamverband kraam- of maandverband in 5 20 minuten is matig vaginaal bloedverlies . Ruim: niet-continue Gering: af stroom en van toe bloed, druppelsgewijs Indicatie: of één slijmerig vol bloedverlies: maand-/kraamverband Kleiner in dan 20 een minuten 2-euro-muntstuk . Matig: niet-continue stroom van bloed. Indicatie: groter dan een 2-euro-muntstuk. Gering: af en toe druppelsgewijs of slijmerig bloedverlies. Indicatie: kleiner dan een 2-euro-muntstuk. "

- *Ondersteuningsvragen* is gewijzigd: "Kunt u vertellen hoeveel bloed u vaginaal verliest? Sinds Is wanneer? ~~dit~~ Welke een kleur? kopje Hoeveel of maand- /kraamverbanden een zijn kraamverband er vol verwisseld binnen in enkele het minuten? afgelopen Sinds uur? wanneer? Waren En deze welke doordrenkt? kleur? "
- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "12 jaar" naar "10 jaar"
- Antwoorden zijn gewijzigd

121) Triagecriterium "Vegetatieve verschijnselen" is gewijzigd:

- *Naam* is gewijzigd van "Vegetatieve verschijnselen" naar "Shockverschijnselen"
- *Omschrijving* is gewijzigd: "Verschijnselen ~~Vegetatieve verschijnselen~~ die duiden op ~~shoek~~ shock: ~~zijn~~: niet overeen kunnen komen omdat iemand dan dreigt flauw te vallen of flauwvaltheft een koude en bleke of gemarmerde huidheeft een klamme/zweterige huidkrijgt een verminderd bewustzijn of raakt bewusteloos onrustig en angstig. Het gaat hier dus NIET om een vasovagale reactie op bijvoorbeeld pijn. Voorbij is shockverschijnselen ~~vegetatieve verschijnselen~~ in de afgelopen uren (max. 6). "

122) Triagecriterium "Vermoeden uitgezakte delen" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Zichtbaar zijn van enig deel van het ongeboren kind in de vagina of de navelstreng. De vrouw kan aangeven moeilijk(er) te kunnen lopen en/of het gevoel te hebben dat er 'iets tussen de benen zit'. "

123) Triagecriterium "Zwangerschapduur" is gewijzigd:

- *Ondersteuningsvragen* is gewijzigd: "Bent u zwanger? ~~zwanger~~; Hoeveel hoe weken? lang? Al aan het bevallen?"

124) Triagecriterium "60 jaar of ouder" is verwijderd.

125) Triagecriterium "Acute hartdood 1e graad <50 jaar" is verwijderd.

126) Triagecriterium "Cocainegebruik" is verwijderd.

127) Triagecriterium "Insult bij zwangerschap" is verwijderd.

128) Triagecriterium "Verandering bloedverlies kraamvrouw" is verwijderd.

129) Triagecriterium "Vocht of bloed uit oor" is verwijderd.

## Triagetypen

Er zijn geen wijzigingen.

## Urgentiecategorieën

Er zijn geen wijzigingen.

# Urgentiecategorie Afwijkingen

Er zijn geen wijzigingen.

## Vervolgacties

Er zijn geen wijzigingen.

## Vervolgactie Afwijkingen

Er zijn geen wijzigingen.

## Ziektebeelden

130) Ziektebeeld "Postnatale zorg" is toegevoegd.

131) Ziektebeeld "Achillespeesletsel" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Letsel Gevoel aan de van achillespees: plotseling de scheuren, grootste zweeps slag, en stekende sterkste pijn pees en van soms het zelfs menselijk een lichaam knal . Voorbeelden: ruptuur, overbelasting. De Een patiënt achillespeesletsel kan leidt niet zelden goed tot op een het operatieve been ingreep staan . "

132) Ziektebeeld "Bewustzijnsdaling, mate van" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Bewusteloosheid: reageert niet op aanspreken, noch op pijnprikkels, aanraken of schudden. Verminderd bewustzijn: reageert met bewegen op aanspreken of pijnprikkels, opent de ogen, is te wekken maar reageert niet adequaat. "

133) Ziektebeeld "Intoxicatie kind, nicotine" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Een halve sigaret of een peuk is ongevaarlijk. Een dosis van 1 mg/kg lichaamsgewicht is schadelijk. Een sigaret bevat 12 mg nicotine, halfzware shag 20 mg en zware shag 30 mg; de beschikbaarheid van nicotine uit tabaksproducten is 20 procent. Voor eenkind een kind van een-jaar jaar is er vergiftigingsgevaar bij het opeten van: vier hele klant-en-klare sigaretten of acht peuken; twee sigaretten zelfgerolde halfzware shag of vijf peuken; één sigaret zelfgerolde zware shag of drie peuken. Nicotinekauwgom en snuif zijn gevaarlijker. Eerste hulp: kind laten braken door de achterwand van de keel te prikkelen met bijvoorbeeld de steel van een lepel. "

134) Ziektebeeld "Soa, algemeen" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Een seksueel overdraagbare aandoening is een besmettelijke ziekte die door onveilig vrijen kan worden overgedragen. Voorbeelden zijn chlamydia, gonorrhoe, syfilis, aids en hepatitis B. Soms geeft een soa lange tijd nauwelijks of geen klachten en wordt de partner ongemerkt besmet. Klachten bij de vrouw die op een soa kunnen wijzen zijn: ongewone vaginale afscheiding (overvloedig, geelgroen of sterk ruikend) zweer(tjes), wratten of branderige blaasjes op de schaamlippen en de vaginavaginaal bloedverlies na geslachtsgemeenschap (contactbloeding) of tussen de menstruatiespijn in de onderbuik. Klachten bij de man die op een soa kunnen wijzen zijn: ongewone vaginale afscheiding (overvloedig, geelgroen of sterk ruikend) zweer(tjes), wratten of branderige blaasjes op de penis of eikel, schaamlippen of en waterig de vocht vaginavaginaal uit bloedverlies de na plasbuis geslachtsgemeenschap (druiper contactbloeding). Bij beiden kunnen wratten of zweertjes bij tussen de anus, pijnlijk (branderig) plassen, pijnlijke anus, geelzucht, opgezette klieren menstruatiespijn in de liezen, jeuk in het schaamhaar verband houden met een soa onderbuik. Sommige soa's hebben ernstige gevolgen als ze niet op tijd worden behandeld. De meeste soa's zijn goed te behandelen. Om met zekerheid een soa te kunnen vaststellen is aanvullende diagnostiek nodig. Het overdrachtrisico van een soa wordt sterk gereduceerd door condoomgebruik. "

135) Ziektebeeld "Trauma oog" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Door een kneuzing kunnen alle inwendige structuren van het oog beschadigd raken. Vooral een klap op het oog met een voorwerp dat kleiner is dan de opening van de orbita zoals een squashbal, is gevaarlijk. Bij een perforatieis perforatie is er cornea- of scleraverscheuring. De visus is bijna altijd verminderd. Meestal doet een perforatie weinig pijn. "

136) Ziektebeeld "Wekadvies" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Is een observatie-advies om tijdig geïnformeerd te zijn over een (eventueel in de slaap) intracraniale drukverhoging door bloeding of oedeem. De patiënt moet de eerste 24 uur in de gaten worden gehouden. Een hersenbeschadiging blijkt binnen 24 uur. Controleer de patiënt de eerste zes uur elk uur, daarna om de twee uur, ook 's nachts. Zet de wekker en laat de patiënt niet alleen. Controleer bij kinderen, die na een schedeltrauma vaak in slaap vallen, regelmatig of zij gewekt kunnen worden. "