

Legenda

Toegevoegde tekst: Toegevoegd

Verwijderde tekst: ~~Verwijderd~~

Databaserversies

Oude versie: NTS-11-10-250530-xml

Nieuwe versie: NTS-11-20-260109-xml

Adviezen

1) Advies "Contactadvies duizelig hoogurgent" is toegevoegd.

2) Advies "Contactadvies kortademigheid hoogurgent" is gewijzigd:

- *Naam* is gewijzigd van "Contactadvies kortademigheid hoogurgent" naar "Contactadvies kortademig hoogurgent"

3) Advies "Contactadvies rectale klachten hoogurgent" is gewijzigd:

- *Inhoud* is gewijzigd: "Bel direct terug bij verergering of nieuwe klachten: shockverschijnselenverminderd ~~verminderd~~ bewustzijn ~~bewustzijn~~ vegetatieve klachten . "

4) Advies "Contactadvies rugpijn hoogurgent" is gewijzigd:

- *Inhoud* is gewijzigd: "Bel direct terug bij verergering of nieuwe klachten: shockverschijnselenverminderd ~~vegetatieve verschijnselenverminderd~~ bewustzijn. "

5) Advies "Epipen" is gewijzigd:

- *Inhoud* is gewijzigd: "Instructie epipen: Pak de pen in het midden vast Luister nu eerst goed naar de instructie en doe nog niets Haal zometeen de veiligheidsdop eraf Zet daarna de andere (gekleurde) kant van de epipen loodrecht stevig tegen de dij tot u een klik hoort. Dit mag door de kleding heen. Houd dan de epipen 10 seconden stevig op zijn plaats. Begrijpt u dit? Haal dan nu de veiligheidsdop eraf en plaats de andere kant van de pen in het been tot u de klik hoort. Ik tel 10 seconden met u mee. Verwijder de pen nu loodrecht uit het been. Wrijf 10 seconden over de injectieplek. Als de symptomen binnen 5-15 minuten na de eerste injectie niet verbeteren of verslechteren, moet De u epipen een kan tweede ook injectie gebruikt toedienen worden (indien bij aanwezig) zwangeren . De epipen kan ook gebruikt worden bij zwangeren. "

6) Advies "Luchtwegobstructie baby" is gewijzigd:

- Stappenplan "Instructie" (id 21) is gewijzigd:
 - Stap 'Klappen tussen schouderbladen' (id 122) is gewijzigd:

- *Tekst van blok* (id 210) is gewijzigd: "We are going to try to clear the throat.If the baby becomes unconscious, tell me immediately.Sit down. Lay the baby on its stomach on your forearm with its head down.Support the head. Do not squeeze the throat.Strike hard between the shoulder blades 5 (five) times. Do not strike 5 (five) times in quick succession, but try to loosen the object with each strike. Do you understand?"
- *Tekst van blok* (id 210) is gewijzigd: "Wir werden jetzt versuchen die Luftröhre wieder zu öffnen.Wenn das Baby ohnmächtig wird, sagen Sie es sofort.Setzen Sie sich.Legen Sie das Baby auf den Bauch auf Ihren Unterarm mit dem Kopf nach unten liegend.Stützen Sie den Kopf. Die Kehle nicht zusammendrücken.Klopfen Sie 5 (fünf) mal kräftig zwischen den Schulterblättern. Klopfen Sie nicht zu schnell. Versuchen Sie mit jedem Schlag den Fremdkörper zu lösen.Verstehen Sie diese Anweisungen?"
- Stap 'Borstcompressies' (id 123) is gewijzigd:
 - *Tekst van blok* (id 299) is gewijzigd: "If the baby becomes unconscious, tell me immediately.Turn the baby on its back with your hand around the back of its head.Lean on your thigh.Place 2 (two) fingertips in the middle of the chest.Compress the chest hard 5 (five) times. Give one † compression per second. With each push, try to release the object.Do you understand the instructions?"
 - *Tekst van blok* (id 299) is gewijzigd: "Wenn das Kind ohnmächtig wird, sagen Sie es sofort.Drehen Sie das Baby auf den Rücken und legen Sie Ihre hand um seinen Hinterkopf.Stützen Sie sich auf Ihren Oberschenkel.Legen Sie 2 (zwei) Fingerspitzen in die Mitte des Brustkorbs.Drücken Sie den Brustkorb 5 (fünf) mal kräftig zusammen. Drücken Sie ein mal pro Sekunde. Versuchen Sie bei jedem Druck das Object zu lösen.Verstehen Sie diese Anweisungen?"
- Stap 'Obstructie nog aanwezig' (id 124) is gewijzigd:
 - *Tekst van blok* (id 223) is gewijzigd: "We will now alternate between punches between the shoulder blades and chest compressions.We are going to try to clear the throat.If the baby becomes unconscious, tell me immediately.Sit down. Lay the baby on its stomach on your forearm with its head down.Support the head. Do not squeeze the throat.Strike hard between the shoulder blades 5 (five) times. Do not strike 5 (five) times in quick succession, but try to loosen the object with each strike. Is the obstruction gone? Can the baby breathe again? "
 - *Tekst van blok* (id 223) is gewijzigd: "Wir werden jetzt die Schläge zwischen die Schulterblättern und Brustkompressionen abwechseln.Wir werden jetzt versuchen die Luftröhre wieder zu öffnen.Wenn das Baby ohnmächtig wird, sagen Sie es sofort.Setzen Sie sich.Legen Sie das Baby auf den Bauch auf Ihren Unterarm mit dem Kopf nach unten liegend.Stützen Sie den Kopf. Die Kehle nicht zusammendrücken.Klopfen Sie 5 (fünf) mal kräftig zwischen den Schulterblättern. Klopfen Sie nicht zu schnell. Versuchen Sie mit jedem Schlag den Fremdkörper zu lösen.Hat sich die Blockade gelöst? Kan die Baby wieder atmen? "
 - *Tekst van blok* (id 225) is gewijzigd: "We are now going to give chest compressions again.If the baby becomes unconscious, tell me

immediately. Turn the baby on its back with your hand around the back of its head. Lean on your thigh. Place 2 (two) fingertips in the middle of the chest. Compress the chest hard 5 (five) times. Give one ~~+~~ compression per second. With each push, try to release the object. Is the obstruction gone? Can the baby breathe again? "

- *Tekst van blok* (id 225) is gewijzigd: "Wir werden jetzt wieder Brustkompressionen geben. Wenn das Kind ohnmächtig wird, sagen Sie es sofort. Drehen Sie das Baby auf den Rücken und legen Sie Ihre hand um seinen Hinterkopf. Stützen Sie sich auf Ihren Oberschenkel. Legen Sie 2 (zwei) Fingerspitzen in die Mitte des Brustkorbs. Drücken Sie den Brustkorb 5 (fünf) mal kräftig zusammen. Drücken Sie ein mal pro Sekunde. Versuchen Sie bei jedem Druck das Object zu lösen. Hat der Fremdkörper sich gelöst? Kann das Baby wieder normal atmen? "

7) Advies "Luchtwegobstructie kind" is gewijzigd:

- Stappenplan "Instructie" (id 22) is gewijzigd:
 - Stap 'Klappen tussen schouderbladen' (id 138) is gewijzigd:
 - *Tekst van blok* (id 293) is gewijzigd: "We are going to try to clear the throat. If the child becomes unconscious, tell me immediately. Have the child bend forward slightly and stand behind it. Support the chest with one hand. Strike hard between the shoulder blades 5 (five) times. Do not strike 5 (five) times in quick succession, but try to loosen the object with each strike. Do you understand?"
 - *Tekst van blok* (id 293) is gewijzigd: "Wir werden jetzt versuchen die Luftröhre wieder zu öffnen. Wenn das Kind ohnmächtig wird, sagen Sie es sofort. Lass das Kind etwas vorüber beugen und stehen Sie hinter den Kind. Unterstützen sie die Brust mit einer Hand. Klopfen Sie 5 (fünf) mal kräftig zwischen den Schulterblättern. Klopfen Sie nicht zu schnell. Versuchen Sie mit jedem Schlag den Fremdkörper zu lösen. Verstehen Sie diese Anweisungen?"
 - Stap 'Buikstoten' (id 139) is gewijzigd:
 - *Tekst van blok* (id 304) is gewijzigd: "With a quick, firm motion, pull both hands towards you and upward. Do this 5 (five) times. Is the obstruction gone? Can the child breathe again? "
 - *Tekst van blok* (id 304) is gewijzigd: "Ziehen Sie mit einer schnellen, kräftigen Bewegung beide Hände ruckartig nach hinten und oben. Wiederholen Sie diesen Vorgang maximal 5 (fünf) mal. Hat der Fremdkörper sich gelöst? Atmet das Kind wieder auf einer normalen Weise? "
 - Stap 'Obstructie nog aanwezig' (id 140) is gewijzigd:
 - *Tekst van blok* (id 308) is gewijzigd: "We will now alternate between punches between the shoulder blades and abdominal thrusts. If the child becomes unconscious, tell me immediately. Have the child bend forward slightly and stand behind it. Support the chest with one hand. Strike hard between the shoulder blades 5 (five) times. Do not strike 5 (five) times in quick succession, but try to loosen the object with each strike. Do you understand?"
 - *Tekst van blok* (id 308) is gewijzigd: "Wir werden jetzt abwechselnd Stöße zwischen die Schulterblättern und Brustkompressionen

geben. Wenn das Kind ohnmächtig wird, sagen Sie es sofort. Lass das Kind etwas vorüber beugen und stehen Sie hinter den Kind. Unterstützen sie die Brust mit einer Hand. Klopfen Sie 5 (fünf) mal kräftig zwischen den Schulterblättern. Klopfen Sie nicht zu schnell. Versuchen Sie mit jedem Schlag den Fremdkörper zu lösen. Verstehen Sie diese Anweisungen?"

- *Tekst van blok* (id 310) is gewijzigd: "We are now going to give abdominal thrusts again. If the child becomes unconscious, tell me immediately. Stand or kneel behind the child. Wrap your arms around the abdomen. Have the child lean forward. Make a fist and place it between the chest and navel. Grasp your fist with the other hand. With a quick, firm motion, pull both hands towards you and upward. Do this 5 (five) times. Is the obstruction gone? Can the child breathe again? "
- *Tekst van blok* (id 310) is gewijzigd: "Wir werden jetzt wieder Bauchstöße geben. Wenn das Kind ohnmächtig wird, sagen Sie es sofort. Stellen Sie sich oder knien Sie hinter das Opfer. Umfassen Sie mit beiden Armen den Bauch. Beugen Sie das Kind nach vorne. Mit der einen Hand bilden Sie eine Faust und legen zwischen Brust und Bauchnabel. Mit der anderen Hand greifen sie die Faust. Ziehen Sie mit einer schnellen, kräftigen Bewegung beide Hände ruckartig nach hinten und oben. Wiederholen Sie diesen Vorgang maximal 5 (fünf) mal. Hat der Fremdkörper sich gelöst? Atmet das Kind wieder auf einder normalen Weise? "

8) Advies "Luchtwegobstructie volwassene" is gewijzigd:

- Stappenplan "Instructie" (id 23) is gewijzigd:
 - Stap 'Klappen tussen schouderbladen' (id 152) is gewijzigd:
 - *Tekst van blok* (id 351) is gewijzigd: "We are going to try to clear the throat. If the victim becomes unconscious, tell me immediately. Stand to the side slightly behind the victim. Support the chest with one hand. Have the victim bend forward slightly. Strike hard between the shoulder blades 5 (five) times. Do not strike 5 (five) times in quick succession, but try to loosen the object with each strike. Do you understand?"
 - *Tekst van blok* (id 351) is gewijzigd: "Wir werden jetzt versuchen die Luftröhre wieder zu öffnen. Wenn das Opfer ohnmächtig wird, sagen Sie es sofort. Stellen Sie sich seitlich hinter das Opfer. Unterstützen Sie die Brust mit einer Hand. Beugen Sie das Opfer etwas nach vorne. Klopfen Sie 5 (fünf) mal kräftig zwischen den Schulterblättern. Klopfen Sie nicht zu schnell. Versuchen Sie mit jedem Schlag den Fremdkörper zu lösen. Verstehen Sie diese Anweisungen?"
 - Stap 'Buikstoten' (id 153) is gewijzigd:
 - *Tekst van blok* (id 359) is gewijzigd: "With a quick, firm motion, pull both hands towards you and upward. Do this 5 (five) times. Is the obstruction gone? Can the victim breathe again? "
 - *Tekst van blok* (id 359) is gewijzigd: "Ziehen Sie mit einer schnellen, kräftigen Bewegung beide Hände ruckartig nach hinten und oben. Wiederholen Sie diesen Vorgang maximal 5 (fünf) mal. Hat der

Fremdkörper sich gelöst? Atmet die Person wieder auf einder normalen Weise? "

- Stap 'Obstructie nog aanwezig' (id 154) is gewijzigd:
 - *Tekst van blok* (id 363) is gewijzigd: "We will now alternate between punches between the shoulder blades and abdominal thrusts.If the victim becomes unconscious, tell me immediately.Stand to the side slightly behind the victim.Support the chest with one hand.Have the victim bend forward slightly.Strike hard between the shoulder blades **5 (five) times**. Do not strike **5 (five)** times in quick succession, but try to loosen the object with each strike.Is the obstruction gone? Can the victim breathe again? "
 - *Tekst van blok* (id 363) is gewijzigd: "Wir werden jetzt abwechselnd Stöße zwischen die Schulterblättern und Brustkompressionen geben. Wenn das Opfer ohnmächtig wird, sagen sie es sofort.Stellen Sie sich seitlich hinter das Opfer.Unterstützen Sie den Brustkorb mit einer Hand.Lassen Sie das Opfer etwas vorüberbeugen. Klopfen Sie **5 (fünf)** mal schnell hintereinander kräftig zwischen die Schulterblättern.Hat sich der Fremdkörper gelöst? Kann das Opfer wieder atmen? "
 - *Tekst van blok* (id 365) is gewijzigd: "We are now going to give abdominal thrusts again.If the victim becomes unconscious, tell me immediately.Stand behind the victim.Wrap your arms around the upper part of the abdomen.Have the victim lean forward.Make a fist and place it on the upper part of the abdomen.Grasp your fist with the other hand.With a quick, firm motion, pull both hands towards you and upward.Do this **5 (five)** times.Is the obstruction gone? Can the victim breathe again? "
 - *Tekst van blok* (id 365) is gewijzigd: "Wir werden jetzt wieder Bauchstöße geben. Wenn das Opfer ohnmächtig wird, sagen Sie es sofort.Stellen Sie sich hinter das Opfer.Umfassen Sie mit beiden Armen den Oberbauch.Beugen Sie das Opfer nach vorne.Mit der einen Hand bilden Sie eine Faust und legen diese am Oberbauch.Mit der anderen Hand greifen sie die Faust.Ziehen Sie mit einer schnellen, kräftigen Bewegung beide Hände ruckartig nach hinten und oben.Wiederholen Sie diesen Vorgang maximal **5 (fünf)** mal.Hat der Fremdkörper sich gelöst? Atmet die Person wieder auf einder normalen Weise? "

9) Advies "Partus instructie" is gewijzigd:

- Stap " toegevoegd

10) Advies "Reanimatie drenkeling/verstikking volwassene" is gewijzigd:

- Stappenplan "Instructie" (id 25) is gewijzigd:
 - Stap 'Rugligging' (id 171) is gewijzigd:
 - *Tekst van blok* (id 420) is gewijzigd: "Leg het slachtoffer op de rug ~~op een harde ondergrond~~ . "
 - *Tekst van blok* (id 420) is gewijzigd: "Lay the victim on his back ~~on a hard surface~~ . "
 - *Tekst van blok* (id 420) is gewijzigd: "Legen Sie das Opfer auf dem Rücken ~~auf eine harte Unterlage~~ . "

- Stap 'Kan reanimeren - Beademing' (id 172) is gewijzigd:
 - *Omschrijving* is gewijzigd: "Kan reanimeren - **Beademing** **beademing** "
 - *Tekst van blok* (id 431) is gewijzigd: "We start by giving rescue breaths. Do you remember how to do it? Kneel next to the victim's upper arm. Place one hand on the forehead and one hand under the chin. Gently tilt the head back by pushing the chin up. Squeeze the victim's nose with 2 **(two)** fingers of the hand resting on his forehead. Keep the chin up and keep the mouth slightly open. Now first listen carefully to my explanation. Take a normal breath yourself, place your lips around the victim's mouth and ensure an airtight seal. Blow in gently for 1 **(one)** second as with a normal exhalation. The chest should rise. Remove your mouth from the victim's mouth and see if the chest goes down again. Do you understand? Now give **5 (five)** rescue breaths. "
 - *Tekst van blok* (id 431) is gewijzigd: "Wir werden jetzt Belüftung geben. Wissen Sie noch wie? Knien Sie neben dem Opfer im Höhe des Oberarms. Legen Sie Ihre Hand auf die Stirn und eine Hand unter das Kinn. Neigen Sie den Kopf vorsichtig nach hinten, indem Sie das Kinn nach oben drücken. Quetschen Sie die Nase des Opfers mit 2 **(zwei)** Fingern aus der Hand, die auf seiner Stirn ruht. Heben Sie das Kinn an und halten Sie den Mund leicht geöffnet. Hören Sie jetzt genau zu. Atmen Sie selbst ganz normal ein, legen Sie Ihre Lippen um den Mund des Opfers und dichten Sie ihn luftdicht ab. Atmen Sie 1 **(ein)** Sekunde lang sanft aus wie bei einer normaler Atmung. Die Brust soll sich heben. Nehmen Sie Ihren Mund vom Opfer weg und prüfen Sie, ob die Brust wieder nach unten geht. Verstehen Sie? Jetzt geben Sie fünf Belüftungen. "
 - *Tekst van blok* (id 432) is gewijzigd: "Als de borstkas niet omhoog komt, dan mondinspectie. Beëindig instructie als: professionele hulp het overneemthet slachtoffer zelf beweegt, de ogen opent en/of normaal ademtde reanimist uitgeput is. Bij **ROSC / tekenen van leven: ROSC:** instrueer rugligging plus **hoofdkantel-/kinliftmethode chinlift** , voortdurend **bewustzijn en** ademhaling controleren. Houd melder aan de lijn totdat hulp gearriveerd is. "
- Stap 'Kan niet reanimeren - Borstcompressies' (id 173) is gewijzigd:
 - *Tekst van blok* (id 427) is gewijzigd: "We gaan nu hartmassage geven. Luister goed. Zet één hand midden op de borstkas (kleding aanlaten). Zet de andere hand bovenop de eerste. Haak de vingers van beide handen in elkaar. Ga met uw bovenlichaam recht boven uw handen hangen en strek uw armen. **Druk zo hard als je kan Duw** de borstkas **diep in-(5 cm)** , laat de borstkas weer omhoog komen en laat niet los. Doe dit 30 keer in een tempo van 2 keer per seconde. Ik tel met u mee. U doet het goed. "
 - *Tekst van blok* (id 427) is gewijzigd: "We're gonna give CPR (chest compressions) now. Listen carefully. Place the palm of one hand in the middle of the victim's chest (leave clothes on). Place your other hand on top of the first. Interlock the fingers of both hands. Position yourself vertically above your hands and extend your arms. Press down the chest **as deeply hard (2 as inches you / can 5 cm)** . Let the chest come back up again; keep your hands on the chest. Keep repeating 30 **(thirty) times**

- times** at a rate of 2 **(two)** compressions per second. I will help you count. You're doing very well. "
- *Tekst van blok* (id 427) is gewijzigd: "Wir werden jetzt Brustkompressionen geben. Hören Sie gut zu. Legen Sie eine Hand auf die Mitte des Brustkorbs. (**Lassen Sie Lass** die Kleidung an.) Legen Sie Ihre andere Hand auf die erste Hand. Falten Sie Ihre Finger von beiden Händen in einander. Positionieren Sie sich senkrecht über Ihrer Hand. Strecken Sie die Arme aus. Drücken Sie das Brustbein **ein so tief fest ein wie (5 möglich Centimeter)** . **Lassen Sie Lass** die Brustkorb wieder nach oben kommen und bleiben Sie in Kontakt mit dem Brustkorb. Setzen Sie das 30 **(dreißig) Mal Mal** im Tempo von 2 **(zwei) Mal** pro Sekunde. Ich werde mit Ihnen zählen. Sie machen das gut. "
 - *Tekst van blok* (id 428) is gewijzigd: "Indien mogelijk: iedere 2 minuten afwisselen met andere persoon. Beëindig instructie als: professionele hulp het overneemthet slachtoffer zelf beweegt, ogen opent en/of normaal ademtde reanimist uitgeput is. **Bij ROSC / tekenen van leven: instrueer rugligging plus hoofdkantel-/kinliftmethode, voortdurend bewustzijn en ademhaling controleren. Houd melder aan de lijn totdat hulp gearriveerd is.** "
 - Stap 'Kan niet reanimeren - Beademing' (id 174) is gewijzigd:
 - *Tekst van blok* (id 424) is gewijzigd: "We start by giving rescue breaths. Kneel next to the victim's upper arm. Place one hand on the forehead and one hand under the chin. Gently tilt the head back by pushing the chin up. Squeeze the victim's nose with 2 **(two)** fingers of the hand resting on his forehead. Keep the chin up and keep the mouth slightly open. Now first listen carefully to my explanation. Take a normal breath yourself, place your lips around the victim's mouth and ensure an airtight seal. Blow in gently for 1 **(one)** second as with a normal exhalation. The chest should rise. Remove your mouth from the victim's mouth and see if the chest goes down again. Do you understand? Now give **5 (five)** rescue breaths. "
 - *Tekst van blok* (id 424) is gewijzigd: "Wir werden jetzt Belüftung geben. Knien Sie neben dem Opfer im Höhe des Oberarms. Legen Sie Ihre Hand auf die Stirn und eine Hand unter das Kinn. Neigen Sie den Kopf vorsichtig nach hinten, indem Sie das Kinn nach oben drücken. Quetschen Sie die Nase des Opfers mit 2 **(zwei) Fingern Fingern** aus der Hand, die auf seiner Stirn ruht. Heben Sie das Kinn an und halten Sie den Mund leicht geöffnet. Hören Sie jetzt genau zu. Atmen Sie selbst ganz normal ein, legen Sie Ihre Lippen um den Mund des Opfers und dichten Sie ihn luftdicht ab. Atmen Sie 1 **(ein)** Sekunde lang sanft aus wie bei einer normaler Atmung. Die Brust soll sich heben. Nehmen Sie Ihren Mund vom Opfer weg und prüfen Sie, ob die Brust wieder nach unten geht. Verstehen Sie? Jetzt geben Sie **5 (fünf)** Belüftungen. "
 - *Tekst van blok* (id 425) is gewijzigd: "Als de borstkas niet omhoog komt, dan mondinspectie. Beëindig instructie als: professionele hulp het overneemthet slachtoffer zelf beweegt, de ogen opent en/of normaal ademtde reanimist uitgeput is. Bij **ROSC / tekenen van leven: ROSC: instrueer rugligging plus hoofdkantel-/kinliftmethode ehinlift** ,

- voortdurend **bewustzijn en** ademhaling controleren. Houd melder aan de lijn totdat hulp gearriveerd is. "
- Stap 'Kan reanimeren - Borstcompressies' (id 175) is gewijzigd:
 - *Tekst van blok* (id 434) is gewijzigd: "We gaan nu hartmassage geven. Weet u nog hoe het moet? Zet één hand midden op de borstkas (kleding aanlaten). Zet de andere hand bovenop de eerste. Haak de vingers van beide handen in elkaar. Ga met uw bovenlichaam recht boven uw handen hangen en strek uw armen. **Druk Duw zo de hard borstkas als diep je in (1/3e kan van de borstkas in)** , laat de borstkas weer omhoog komen en laat niet los. Doe dit 30 keer in een tempo van 2 keer per seconde. Ik tel met u mee. U doet het goed. "
 - *Tekst van blok* (id 434) is gewijzigd: "We're gonna give CPR (chest compressions) now. Do you remember how to do it? Place the palm of one hand in the middle of the victim's chest (leave clothes on). Place your other hand on top of the first. Interlock the fingers of both hands. Position yourself vertically above your hands and extend your arms. Press down the chest **as deeply hard (2 as inches you / can 5-em)** . Let the chest come back up again; keep your hands on the chest. Keep repeating 30 **(thirty)** times at a rate of 2 **(two)** compressions per second. I will help you count. You're doing very well. "
 - *Tekst van blok* (id 434) is gewijzigd: "Wir werden jetzt Brustkompressionen geben. Wissen Sie noch wie? Legen Sie eine Hand auf die Mitte des Brustkorbs. (Lass die Kleidung an.) Legen Sie Ihre andere Hand auf die erste Hand. Falten Sie Ihre Finger von beiden Händen in einander. Positionieren Sie sich senkrecht über Ihrer Hand. Strecken Sie die Arme aus. Drücken Sie das Brustbein **ein so tief fest ein wie (5 möglich Centimeter)** . Lass die Brustkorb wieder nach oben kommen und bleiben Sie in Kontakt mit dem Brustkorb. Setzen Sie das 30 **(dreißig) Mal Mal** im Tempo von 2 **(zwei)** Mal pro Sekunde. Ich werde mit Ihnen zählen. Sie machen das gut. "
 - *Tekst van blok* (id 435) is gewijzigd: "Indien mogelijk: iedere 2 minuten afwisselen met andere persoon. Beëindig instructie als: professionele hulp het overneemthet slachtoffer zelf beweegt, ogen open en/of normaal ademt de reanimist uitgeput is. Bij **ROSC / tekenen van leven: ROSC:** instrueer rugligging plus **hoofdkantel- /kinliftmethode ehinlift** , voortdurend **bewustzijn en** ademhaling controleren. Houd melder aan de lijn totdat hulp gearriveerd is. "
 - Stap 'Beademing en borstcompressies (kort)' (id 176) is gewijzigd:
 - *Tekst van blok* (id 437) is gewijzigd: "Give 2 **(two)** rescue breaths again. Place your hands in the middle of the victim's chest and give 30 **(thirty)** chest compressions. Give by turns 2 **(two)** rescue breaths and 30 **(thirty)** compressions. Do not hang up the phone."
 - *Tekst van blok* (id 437) is gewijzigd: "Geben Sie wieder 2 **(zwei)** Belüftungen. Legen Sie Ihre Hände sofort wieder auf die Mitte des Brustkorbs und geben Sie 30 **(dreißig) Brustkompressionen Brustkompressionen** . Abwechselnd 2 **(zwei)** Belüftungen und 30 **(dreißig) Brustkompressionen geben Brustkompressionen geben** . Trennen Sie nicht die Telefonverbindung."
 - *Tekst van blok* (id 438) is gewijzigd: "Indien mogelijk: iedere 2 minuten **of na 4 eyeli** afwisselen met andere persoon. Als de beademing

niet effectief is: geef alleen hartmassages. Beëindig instructie als: professionele hulp het overneemthet slachtoffer zelf beweegt, de ogen opent en/of normaal ademtde reanimest uitgeput is. Bij ROSC / tekenen van leven: ROSC: instrueer rugligging plus hoofdkantel- /kinliftmethode chinlift , voortdurend bewustzijn en ademhaling controleren. Houd melder aan de lijn totdat hulp gearriveerd is. "

- Startscherm (id 168) is gewijzigd:
 - *Tekst van blok* (id 410) is gewijzigd: "Er komt met spoed een ambulance naar u toe. Verbreek de verbinding niet. We gaan nu starten met reanimeren. Ik ga u instructies geven, luister goed. Zet de telefoon op de speakerstand en leg deze dicht bij het slachtoffer. Kunt u reanimeren? Zijn er mensen bij in u de buurt die kunnen reanimeren? Is er een AED direct beschikbaar? dichtbij? "
 - *Tekst van blok* (id 410) is gewijzigd: "An ambulance is on its way to you. Please stay on the phone. We are now going to start CPR. I'm going to give you instructions. Listen carefully. Put the phone on speakermode and place it close to the victim. Do you know how to give CPR? Are other people around who can give CPR? Is there an AED (defibrillator) readily available? nearby? "
 - *Tekst van blok* (id 410) is gewijzigd: "Es kommt mit eile ein Rettungswagen zu Ihnen. Bitte nicht auflegen. Wir werden jetzt mit der Wiederbelebung beginnen. Ich werde Ihnen weitere Instruktionen geben. Hören Sie gut zu. Stellen Sie das Telefon auf freisprechen und legen Sie es in die nähe des Opfers. Können Sie wiederbeleben? Sind in Ihrer Umgebung Menschen die wiederbeleben können? Ist ein Defibrillator sofort in verfügbar? der nähe? "
 - *Tekst van blok* (id 411) is gewijzigd: "Als AED binnen 1 minuut direct beschikbaar is: kies 'AED'. "
- Omstandighedenschermb (id 178) is gewijzigd:
 - *Tekst van blok* (id 414) is gewijzigd: "Let op! Wordt er een rechtsgeldige niet-reanimerenverklaring van het slachtoffer aangetroffen? Ja: stop reanimatie-instructie Nee / onzeker / weet niet: continueer reanimatie-instructie. Mensen kunnen ervoor kiezen een niet-reanimerenverklaring op te stellen. Deze moet aan een aantal eisen voldoen: de wilsverklaring moet geschreven zijn en te herleiden zijn tot de persoon die de verklaring uitte. De verklaring kan op papier staan en kan ook een penning zijn. Een niet-reanimeren-verklaring moet gerespecteerd worden als dit voor het begin van de reanimatie duidelijk is. Maar hulpverleners moeten bij iemand met een circulatiestilstand niet op zoek gaan naar een geschreven wilsverklaring of een niet-reanimerenpenning. Zo wordt voorkomen dat de reanimatiepoging wordt uitgesteld en de uitkomst van de reanimatie nadelig wordt beïnvloed. Een niet-reanimerenpenning wordt bij het begin van een reanimatie soms niet opgemerkt, omdat de borstkas van het slachtoffer bij basale reanimatie niet hoeft te worden ontbloot. Ook als dat wel het geval is, kan de penning onopgemerkt blijven als deze naar de nek of rug is verschoven. Met name bij de burgerhulpverleners kan verwarring ontstaan als later tijdens de reanimatie de niet-reanimerenwens duidelijk wordt, bijvoorbeeld als de borstkas wordt ontbloot om de elektroden van de AED aan te brengen. De burgerhulpverlener mag zijn reanimatiepoging dan staken, maar kan het besluit om te staken ook overlaten aan de professionele hulpverlener, die naar verwachting enkele minuten later zal arriveren. "
- Omstandighedenschermb (id 177) is gewijzigd:

- *Tekst van blok* (id 416) is gewijzigd: "Zet de AED aan.Voer de opdrachten van de AED uit.Verbreek de telefoonverbinding niet.Laat u zo mogelijk afwisselen als het apparaat na een 2 analyse minuten uitvoert afwisselen ."
- *Tekst van blok* (id 416) is gewijzigd: "Turn on the AED ~~and place the electrodes~~ .Perform the AED's ~~voice/ visual~~ commands.Do not hang up the phone.If possible, take turns while have the someone device take is over performing after an 2 analysis minutes . "
- *Tekst van blok* (id 416) is gewijzigd: "Schalten Sie den Defibrillator ein ~~und platzieren Sie die Elektroden~~ .Führen Sie die ~~sprachlichen/ visuellen~~ Befehle des Defibrillators aus.Trennen Sie nicht die Telefonverbinding.Wenn möglich, wechseln Sie sich ab, wenn das Gerät nach eine 2 Analyse Minuten durchführt ab . "
- *Tekst van blok* (id 417) is gewijzigd: "Beëindig instructie als: professionele hulp het overneemtals het slachtoffer beweegt, de ogen opent en/of normaal ademt.Bij ROSC / tekenen van leven: ROSC: instrueer Instrueer rugligging plus hoofdkantel-/kinliftmethode chinlift , voortdurend bewustzijn en ademhaling controleren. Houd melder aan de lijn totdat hulp gearriveerd is. Laat de AED aangesloten en aan staan . "

11) Advies "Reanimatie kind tot 1 jaar" is gewijzigd:

- Tekst omstandighedenknop B is gewijzigd van "" naar "AED"
- Stappenplan "Instructie" (id 27) is gewijzigd:
 - Stap 'Buitendeur alleen' (id 191) is gewijzigd:
 - *Toon omstandighedenknop B* is gewijzigd van "False" naar "True"
 - Stap 'Buitendeur met hulp' (id 192) is gewijzigd:
 - *Toon omstandighedenknop B* is gewijzigd van "False" naar "True"
 - Stap 'Rugligging' (id 193) is gewijzigd:
 - *Toon omstandighedenknop B* is gewijzigd van "False" naar "True"
 - Stap 'Kan niet reanimeren - beademing' (id 194) is gewijzigd:
 - *Toon omstandighedenknop B* is gewijzigd van "False" naar "True"
 - *Tekst van blok* (id 484) is gewijzigd: "We start by giving rescue breaths. Place 1 (one) hand on the forehead.Hold the head with the face straight up as still as possible. Do not tilt the head.Place 1 (one) or 2 (two) fingertips under the tip of the chin and lift the chin.Keep the chin up and keep the mouth slightly open.Now first listen carefully to my explanation.Take a normal breath yourself, place your lips around the baby's mouth and nose and ensure an airtight seal.Blow in gently for 1 (one) second as with a normal exhalation. Do not blow too hard. The chest should rise.Remove your mouth from the baby and see if the chest goes down again.Do you understand?Now give 5 (five) rescue breaths. "
 - *Tekst van blok* (id 484) is gewijzigd: "Wir werden jetzt Belüftung geben. Legen Sie Ihre Hand auf die Stirn.Halten Sie den Kopf mit den Gesicht gerade nach oben so ruhig wie möglich. Neigen Sie den Kopf nicht.Legen Sie eine oder 2 (zwei) Fingerspitzen unter die Kinns Spitze und heben Sie das Kinn an.Halten Sie das Kinn hoch und den Mund leicht geöffnet. Hören Sie jetzt genau zu.Atmen Sie selbst ganz normal ein, legen Sie Ihre Lippen um den Mund und Nase des Baby's und dichten Sie ihn luftdicht ab.Atmen Sie 1 (ein) Sekunde lang sanft aus

wie bei einer normaler Atmung. Blasen Sie nicht zu stark. Die Brust soll sich heben. Nehmen Sie Ihren Mund vom Mund des Baby's weg und prüfen Sie, ob die Brust wieder nach unten geht. Verstehen Sie? Jetzt geben Sie 5 (fünf) Belüftungen. "

- *Tekst van blok* (id 485) is gewijzigd: "Als mond-neus-beademing niet lukt: knijp de neus dicht met 2 vingers van de hand op het voorhoofd beadem alleen via de mond. Als de borstkas niet omhoog komt: mondinspectie; veeg niet blind met de vinger in de mond controleer of het hoofd niet te ver naar achteren is gekanteld. Beëindig instructie als: professionele hulp het overneemt de baby zelf beweegt, de ogen opent en normaal ademt/huilt. Bij adem/huilt de ROSC reanimist / uitgeput tekenen is. Het terugkeren van leven: de circulatie door alléén beademen en borstcompressies is zeer zeldzaam. Leg de baby dan op de zij. Blijf alert en start zodig de reanimatie weer op. houd de baby in rugligging houd luchtweg vrij met hoofdkantel-/kinliftmethode controleer voortdurend bewustzijn en ademhaling bij twijfel over ademhaling: start onmiddellijk met reanimatie bij braakneigingen: draai baby op de zij houd melder aan de lijn totdat hulp gearriveerd is. Het terugkeren van de circulatie door alléén beademen en borstcompressies is zeer zeldzaam. "
- Stap 'Kan niet reanimeren - borstcompressies' (id 195) is gewijzigd:
 - *Toon omstandigheden knop B* is gewijzigd van "False" naar "True"
 - *Tekst van blok* (id 487) is gewijzigd: "We're gonna give CPR (chest compressions) now. Listen carefully. Place 2 (two) fingers in the middle of the chest (leave clothes on). Press the chest down deeply 1/3rd (one third) 1/3rd of the chest). Don't be afraid to push hard. Let the chest come back up again. Keep your hands on the chest. Keep repeating 15 (fifteen) times at a rate of 2 (two) compressions per second. I will help you count. You're doing very well. "
 - *Tekst van blok* (id 487) is gewijzigd: "Wir werden jetzt Brustkompressionen geben. Hören Sie gut zu. Legen Sie 2 (zwei) Finger auf die Mitte des Brustkorbs. (Lass die Kleidung an.) Drücken Sie das Brustbein tief ein 1/3e (ein drittel) 1/3e des Brustkorbs). Haben Sie keine Angst kräftig zu drücken. Lassen Sie den Brustkorb wieder nach oben kommen und bleiben Sie in Kontakt mit dem Brustkorb. Setzen Sie das 15 (fünfzehn) Mal im Tempo von 2 (zwei) Mal pro Sekunde. Ich werde mit Ihnen zählen. Sie machen das gut. "
 - *Tekst van blok* (id 488) is gewijzigd: "Als het de reanimist niet lukt om met twee vingers de borstkas voldoende diep in te drukken: gebruik dan één hand. Indien mogelijk: iedere 2 minuten afwisselen met andere persoon. Beëindig instructie als: professionele hulp het overneemt de baby zelf beweegt, de ogen opent en normaal adem/huilt de reanimist uitgeput is. Bij Het ROSC terugkeren / van tekenen de van circulatie leven: door alléén beademen en borstcompressies is zeer zeldzaam. Leg de baby dan op de zij. Blijf alert en start zodig de reanimatie weer op. houd de baby in rugligging houd luchtweg vrij met hoofdkantel-/kinliftmethode controleer voortdurend bewustzijn en ademhaling bij twijfel over ademhaling: start onmiddellijk met reanimatie bij braakneigingen: draai baby op de zij houd melder aan de lijn totdat hulp

gearriveerd is. Het terugkeren van de circulatie door alléén beademen en borstcompressies is zeer zeldzaam. "

- Stap 'Kan reanimeren - beademing' (id 196) is gewijzigd:
 - *Toon omstandighedenknop B* is gewijzigd van "False" naar "True"
 - *Tekst van blok* (id 490) is gewijzigd: "We start by giving rescue breaths. Do you remember how to do it? Place 1 (one) hand on the forehead. Hold the head with the face straight up as still as possible. Do not tilt the head. Place 1 (one) or 2 (two) fingertips under the tip of the chin and lift the chin. Keep the chin up and keep the mouth slightly open. Now first listen carefully to my explanation. Take a normal breath yourself, place your lips around the baby's mouth and nose and ensure an airtight seal. Blow in gently for 1 (one) second as with a normal exhalation. Do not blow too hard. The chest should rise. Remove your mouth from the baby and see if the chest goes down again. Do you understand? Now give 5 (five) rescue breaths. "
 - *Tekst van blok* (id 490) is gewijzigd: "Wir werden jetzt Belüftung geben. Wissen Sie noch wie? Legen Sie Ihre Hand auf die Stirn. Halten Sie den Kopf mit dem Gesicht gerade nach oben so ruhig wie möglich. Neigen Sie den Kopf nicht. Legen Sie eine oder 2 (zwei) Fingerspitzen unter die Kinnschuppe und heben Sie das Kinn an. Halten Sie das Kinn hoch und den Mund leicht geöffnet. Hören Sie jetzt genau zu. Atmen Sie selbst ganz normal ein, legen Sie Ihre Lippen um den Mund und Nase des Baby's und dichten Sie ihn luftdicht ab. Atmen Sie 1 (ein) Sekunde lang sanft aus wie bei einer normaler Atmung. Blasen Sie nicht zu stark. Die Brust soll sich heben. Nehmen Sie Ihren Mund vom Mund des Baby's weg und prüfen Sie, ob die Brust wieder nach unten geht. Verstehen Sie? Jetzt geben Sie 5 (fünf) Belüftungen. "
 - *Tekst van blok* (id 491) is gewijzigd: "Als mond-neus-beademing niet lukt: knijp de neus dicht met 2 vingers van de hand op het voorhoofd. Beadem alleen via de mond. Als de borstkas niet omhoog komt: mondinspectie; veeg niet blind met de vinger in de mondcontroleer of het hoofd niet te ver naar achteren is gekanteld. Beëindig instructie als: professionele hulp het overneemt de baby zelf beweegt, de ogen opent en normaal ademt/huilt de reanimist uitgeput is. Bij Het ROSC terugkeren / van tekenen de van circulatie leven: door alléén beademen en borstcompressies is zeer zeldzaam. Leg de baby dan op de zij. Blijf alert en start zonodig de reanimatie weer op. houd de baby in rugligging houd luchtweg vrij met hoofdkantel-/kinliftmethode controleer voortdurend bewustzijn en ademhaling bij twijfel over ademhaling: start onmiddellijk met reanimatie bij braakneigingen: draai baby op de zij houd melder aan de lijn totdat hulp gearriveerd is. Het terugkeren van de circulatie door alléén beademen en borstcompressies is zeer zeldzaam. "
- Stap 'Kan reanimeren - borstcompressies' (id 197) is gewijzigd:
 - *Toon omstandighedenknop B* is gewijzigd van "False" naar "True"
 - *Tekst van blok* (id 493) is gewijzigd: "We're gonna give CPR (chest compressions) now. Do you remember how to do it? Place 2 (two) fingers in the middle of the chest (leave clothes on). Press the chest down deeply, 1/3rd (one third) 1/3rd of the chest. Don't be afraid to push hard. Let the chest come back up again. Keep your hands on the

chest.Keep repeating 15 (fifteen) times at a rate of 2 (two) compressions per second. I will help you count.You're doing very well.

- *Tekst van blok* (id 493) is gewijzigd: "Wir werden jetzt Brustkompressionen geben. Wissen Sie noch wie? Legen Sie 2 (zwei) Finger auf die Mitte des Brustkorbs. (Lass die Kleidung an.)Drücken Sie das Brustbein tief ein, $\frac{1}{3}$ e (ein drittel) ~~$\frac{1}{3}$ e~~ des Brustkorbs). Haben Sie keine Angst kräftig zu drücken.Lassen Sie den Brustkorb wieder nach oben kommen und bleiben Sie in Kontakt mit dem Brustkorb.Setzen Sie das 15 (fünfzehn) Mal im Tempo von 2 (zwei) Mal pro Sekunde. Ich werde mit Ihnen zählen.Sie machen das gut. "
- *Tekst van blok* (id 494) is gewijzigd: "Als het de reanimist niet lukt om met twee vingers de borstkas voldoende diep in te drukken: gebruik dan één hand. Indien mogelijk: iedere 2 minuten afwisselen met andere persoon. Beëindig instructie als: professionele hulp het overneemt de baby zelf beweegt, de ogen opent en normaal ademt/huilt de reanimist uitgeput is.~~Bij Het ROSC terugkeren / van tekenen de van eirculatie leven: door alléén beademen en borsteompressies is zeer zeldzaam. Leg de baby dan op de zij. Blijf alert en start zonodig de reanimatie weer op.~~ houd de baby in rugligging houd luchtweg vrij met hoofdkantel-/kinliftmethodecontroleer voortdurend bewustzijn en ademhalingbij twijfel over ademhaling: start onmiddellijk met reanimatiebij braakneigingen: draai baby op de zijhoud melder aan de lijn totdat hulp gearriveerd is. Het terugkeren van de circulatie door alléén beademen en borstcompressies is zeer zeldzaam. "
- Stap 'Beademing en borstcompressies (kort)' (id 198) is gewijzigd:
 - *Toon omstandighedeknop B* is gewijzigd van "False" naar "True"
 - *Tekst van blok* (id 496) is gewijzigd: "Give 2 (two) rescue breaths again.Place your fingers in the middle of the chest again and give 15 (fifteen) chest compressions.Give by turns 2 (two) rescue breaths and 15 (fifteen) compressions.Do not hang up the phone."
 - *Tekst van blok* (id 496) is gewijzigd: "Geben Sie wieder 2 (zwei) Belüftungen.Legen Sie Ihre Finger sofort wieder auf die Mitte des Brustkorbs und geben Sie 15 (fünfzehn) Brustkompressionen.Abwechselnd 2 (zwei) Belüftungen und 15 (fünfzehn) Brustkompressionen geben.Trennen Sie nicht die Telefonverbindung."
 - *Tekst van blok* (id 497) is gewijzigd: "Indien mogelijk: iedere 2 minuten afwisselen met andere persoon. Als de beademing niet effectief is: geef alleen hartmassages. Beëindig instructie als: professionele hulp het overneemt de baby zelf beweegt, de ogen opent en normaal ademt/huilt de reanimist uitgeput is.~~Bij Het ROSC terugkeren / van tekenen de van eirculatie leven: door alléén beademen en borsteompressies is zeer zeldzaam. Leg de baby dan op de zij. Blijf alert en start zonodig de reanimatie weer op.~~ houd de baby in rugligging houd luchtweg vrij met hoofdkantel-/kinliftmethodecontroleer voortdurend bewustzijn en ademhalingbij twijfel over ademhaling: start onmiddellijk met reanimatiebij braakneigingen: draai baby op de zijhoud melder aan de lijn totdat hulp

gearriveerd is. Het terugkeren van de circulatie door alléén beademen en borstcompressies is zeer zeldzaam. "

- Startscherm (id 190) is gewijzigd:
 - *Toon omstandighedeknop B* is gewijzigd van "False" naar "True"
 - *Samenstelling en/of volgorde van de blokken* is gewijzigd
 - *Tekst van blok* (id 522) is gewijzigd: "Er komt met spoed een ambulance naar u toe. Verbreek de verbinding niet. We gaan nu starten met reanimeren. Ik ga u instructies geven, luister goed. Zet de telefoon op de speakerstand en leg deze dicht bij de baby. Kunt u reanimeren? Zijn er mensen **bij in u de buurt** die kunnen **reanimeren?**[Als melder niet alleen is:] **Is er een AED direct beschikbaar? reanimeren?** "
 - *Tekst van blok* (id 522) is gewijzigd: "An ambulance is on its way to you. Please stay on the phone. We are now going to start CPR. I'm going to give you instructions. Listen carefully. Put the phone on speaker mode and place it close to the baby. Do you know how to give CPR? Are other people around who can give **CPR?**[Als melder niet alleen is:] **CPR? Is there** an AED (defibrillator) **readily available? nearby?** "
 - *Tekst van blok* (id 522) is gewijzigd: "Es kommt mit eile ein Rettungswagen zu Ihnen. Bitte nicht auflegen. Wir werden jetzt mit der Wiederbelebung beginnen. Ich werde Ihnen weitere Instruktionen geben. Hören Sie gut zu. Stellen Sie das Telefon auf freisprechen und legen Sie es in die nähe des Baby's. Können Sie wiederbeleben? Sind in Ihrer Umgebung Menschen die wiederbeleben **können?**[Als melder niet alleen is:] **Ist können? Ist** ein Defibrillator **sofort in der verfügbar? nähe?** "
- Omstandighedenschermb (id 200) is gewijzigd:
 - *Samenstelling en/of volgorde van de blokken* is gewijzigd

12) Advies "Reanimatie kind vanaf 1 jaar" is gewijzigd:

- Stappenplan "Instructie" (id 26) is gewijzigd:
 - Stap 'Kan niet reanimeren - beademing' (id 182) is gewijzigd:
 - *Tekst van blok* (id 455) is gewijzigd: "We start by giving rescue breaths. Stand or kneel at shoulder level. Place one hand on the forehead and **2 (two)** fingertips under the chin. Gently tilt the head back by pushing the chin up. Squeeze the child's nose with **2 (two)** fingers of the hand resting on his forehead. Keep the chin up and keep the mouth slightly open. Now first listen carefully to my explanation. Take a normal breath yourself, place your lips around the child's mouth and ensure an airtight seal. Blow in gently for **1 (one)** second as with a normal exhalation. The chest should rise. Remove your mouth from the child's mouth and see if the chest goes down again. Do you understand? Now give **5 (five)** rescue breaths. "
 - *Tekst van blok* (id 455) is gewijzigd: "Wir werden jetzt Belüftung geben. Stehen oder Knien Sie auf Schulterhöhe. Legen Sie Ihre Hand auf die Stirn und eine Hand unter das Kinn. Neigen Sie den Kopf vorsichtig nach hinten, indem Sie das Kinn nach oben drücken. Quetschen Sie die Nase des Kindes mit **2 (zwei)** Fingern aus der Hand, die auf seiner Stirn ruht. Heben Sie das Kinn an und halten Sie den Mund leicht geöffnet. Hören Sie jetzt genau zu. Atmen Sie selbst ganz normal ein, legen Sie Ihre Lippen um den Mund des Kindes und

dichten Sie ihn luftdicht ab. Atmen Sie 1 (ein) Sekunde lang sanft aus wie bei einer normaler Atmung. Die Brust soll sich heben. Nehmen Sie Ihren Mund vom Mund des Kindes weg und prüfen Sie, ob die Brust wieder nach unten geht. Verstehen Sie? Jetzt geben Sie 5 (fünf) Belüftungen. "

- *Tekst van blok* (id 456) is gewijzigd: "Als de borstkas niet omhoog komt: mondinspectie; veeg niet blind met de vinger in de mondhoofd iets verder naar achteren kantelen. Beëindig instructie als: professionele hulp het overneemthet kind zelf beweegt, de ogen opent en normaal ademt/huiltde reanimist uitgeput is. Bij Het ROSC terugkeren / van tekenen de van eireulatie leven: door alléén beademen en borsteompressies is zeer zeldzaam. Leg het kind dan op de zij. Blijf alert en start zonodig de reanimatie weer op. houd het kind in rugligging houd luchtweg vrij met hoofdkantel- /kinliftmethodecontroleer voortdurend bewustzijn en ademhalingbij twijfel over ademhaling: start onmiddellijk met reanimatiebij braakneigingen: draai het kind op de zijhoud melder aan de lijn totdat hulp gearriveerd is. Het terugkeren van de circulatie door alléén beademen en borstcompressies is zeer zeldzaam. "
- Stap 'Kan niet reanimeren - borstcompressies' (id 183) is gewijzigd:
 - *Tekst van blok* (id 458) is gewijzigd: "We're gonna give CPR (chest compressions) now. Listen carefully. Place 1 (one) hand slightly below the middle of the chest (leave clothes on). Position yourself vertically above your hands and extend your arms. Press the chest down deeply, 1/3rd (one third) 1/3rd of the chest). Let the chest come back up again. Keep your hands on the chest. Keep repeating 15 (fifteen) times 15times at a rate of 2 (two) compressions per second. I will help you count. You're doing very well. "
 - *Tekst van blok* (id 458) is gewijzigd: "Wir werden jetzt Brustkompressionen geben. Hören Sie gut zu. Legen Sie eine Hand etwas unterhalb des Mitten des Brustkorbs. (Lass die Kleidung an.) Positionieren Sie sich senkrecht über Ihrer Hand. Strecken Sie die Arme aus. Drücken Sie das Brustbein tief eind, 1/3e (ein drittel) 1/3e des Brustkorbs). Lassen Sie den Brustkorb wieder nach oben kommen und bleiben Sie in Kontakt mit dem Brustkorb. Setzen Sie das 15 (fünfzehn) Mal im Tempo von 2 (zwei) Mal pro Sekunde. Ich werde mit Ihnen zählen. Sie machen das gut. "
 - *Tekst van blok* (id 459) is gewijzigd: "Als het de reanimist niet lukt om met één hand de borstkas voldoende diep in te drukken: laat de andere hand dan bovenop de eerste zetten, de vingers van beide handen in elkaar haken en de beide armen strekken. Indien mogelijk: iedere 2 minuten afwisselen met andere persoon. Beëindig instructie als: professionele hulp het overneemthet kind zelf beweegt, de ogen opent en normaal ademt/huiltde reanimist uitgeput is. Bij Het ROSC terugkeren / van tekenen de van eireulatie leven: door alléén beademen en borsteompressies is zeer zeldzaam. Leg het kind dan op de zij. Blijf alert en start zonodig de reanimatie weer op. houd het kind in rugligging houd luchtweg vrij met hoofdkantel- /kinliftmethodecontroleer voortdurend bewustzijn en ademhalingbij twijfel over ademhaling: start onmiddellijk met reanimatiebij

braakneigingen: draai het kind op de zijhoud melder aan de lijn totdat hulp gearriveerd is. Het terugkeren van de circulatie door alléén beademen en borstcompressies is zeer zeldzaam. "

- Stap 'Kan reanimeren - beademing' (id 184) is gewijzigd:
 - *Tekst van blok* (id 461) is gewijzigd: "We start by giving rescue breaths. Do you remember how to do it? Stand or kneel at shoulder level. Place one hand on the forehead and 2 (two) fingertips under the chin. Gently tilt the head back by pushing the chin up. Squeeze the child's nose with 2 (two) fingers of the hand resting on his forehead. Keep the chin up and keep the mouth slightly open. Now first listen carefully to my explanation. Take a normal breath yourself, place your lips around the child's mouth and ensure an airtight seal. Blow in gently for 1 (one) second as with a normal exhalation. The chest should rise. Remove your mouth from the child's mouth and see if the chest goes down again. Do you understand? Now give 5 (five) rescue breaths. "
 - *Tekst van blok* (id 461) is gewijzigd: "Wir werden jetzt Belüftung geben. Wissen Sie noch wie? Stehen oder Knien Sie auf Schulterhöhe. Legen Sie Ihre Hand auf die Stirn und eine Hand unter das Kinn. Neigen Sie den Kopf vorsichtig nach hinten, indem Sie das Kinn nach oben drücken. Quetschen Sie die Nase des Kindes mit 2 (zwei) Fingern aus der Hand, die auf seiner Stirn ruht. Heben Sie das Kinn an und halten Sie den Mund leicht geöffnet. Hören Sie jetzt genau zu. Atmen Sie selbst ganz normal ein, legen Sie Ihre Lippen um den Mund des Kindes und dichten Sie ihn luftdicht ab. Atmen Sie 1 (ein) Sekunde lang sanft aus wie bei einer normaler Atmung. Die Brust soll sich heben. Nehmen Sie Ihren Mund vom Mund des Kindes weg und prüfen Sie, ob die Brust wieder nach unten geht. Verstehen Sie? Jetzt geben Sie 5 (fünf) Belüftungen. "
 - *Tekst van blok* (id 462) is gewijzigd: "Als de borstkas niet omhoog komt: mondinspectie; veeg niet blind met de vinger in de mondhoofd iets verder naar achteren kantelen. Beëindig instructie als: professionele hulp het overneemthet kind zelf beweegt, de ogen opent en normaal ademt/huiltde reanimest uitgeput is. ~~Bij Het ROSC terugkeren / van tekenen de van eirculatie leven: door alléén beademen en borsteompressies is zeer zeldzaam. Leg het kind dan op de zij. Blijf alert en start zonodig de reanimatie weer op.~~ houd het kind in rugligging houd luchtweg vrij met hoofdkantel- /kinliftmethodecontroleer voortdurend bewustzijn en ademhalingbij twijfel over ademhaling: start onmiddellijk met reanimatiebij braakneigingen: draai het kind op de zijhoud melder aan de lijn totdat hulp gearriveerd is. Het terugkeren van de circulatie door alléén beademen en borstcompressies is zeer zeldzaam. "
- Stap 'Kan reanimeren - borstcompressies' (id 185) is gewijzigd:
 - *Tekst van blok* (id 464) is gewijzigd: "We're gonna give CPR (chest compressions) now. Do you remember how to do it? Place 1 (one) hand slightly below the middle of the chest (leave clothes on). Position yourself vertically above your hands and extend your arms. Press the chest down deeply, 1/3rd (one third) ~~1/3rd~~ of the chest). Let the chest come back up again. Keep your hands on the chest. Keep repeating 15

(fifteen) times 15times at a rate of 2 (two) compressions per second. I will help you count. You're doing very well. "

- *Tekst van blok* (id 464) is gewijzigd: "Wir werden jetzt Brustkompressionen geben. Wissen Sie noch wie? Legen Sie eine Hand etwas unterhalb des Mitten des Brustkorbs. (Lass die Kleidung an.) Positionieren Sie sich senkrecht über Ihrer Hand. Strecken Sie die Arme aus. Drücken Sie das Brustbein tief ein, $\frac{1}{3}$ e (ein drittel) $\frac{1}{3}$ e des Brustkorbs). Lassen Sie den Brustkorb wieder nach oben kommen und bleiben Sie in Kontakt mit dem Brustkorb. Setzen Sie das 15 (fünfzehn) Mal im Tempo von 2 (zwei) Mal pro Sekunde. Ich werde mit Ihnen zählen. Sie machen das gut. "
- *Tekst van blok* (id 465) is gewijzigd: "Als het de reanimist niet lukt om met één hand de borstkas voldoende diep in te drukken: laat de andere hand dan bovenop de eerste zetten, de vingers van beide handen in elkaar haken en de beide armen strekken. Indien mogelijk: iedere 2 minuten afwisselen met andere persoon. Beëindig instructie als: professionele hulp het overneemthet kind zelf beweegt, de ogen opent en normaal ademt/huiltde reanimist uitgeput is. Bij Het ROSC terugkeren / van tekenen de van circulatie leven: door alléén beademen en borstcompressies is zeer zeldzaam. Leg het kind dan op de zij. Blijf alert en start zonodig de reanimatie weer op. houd het kind in rugligging houd luchtweg vrij met hoofdkantel- /kinliftmethode controleer voortdurend bewustzijn en ademhaling bij twijfel over ademhaling: start onmiddellijk met reanimatie bij braakneigingen: draai het kind op de zij houd melder aan de lijn totdat hulp gearriveerd is. Het terugkeren van de circulatie door alléén beademen en borstcompressies is zeer zeldzaam. "
- Stap 'Beademing en borstcompressies (kort)' (id 186) is gewijzigd:
 - *Tekst van blok* (id 467) is gewijzigd: "Give 2 (two) rescue breaths again. Place your hand slightly below the middle of the chest and give 15 (fifteen) chest compressions. Give by turns 2 (two) rescue breaths and 15 (fifteen) compressions. Do not hang up the phone."
 - *Tekst van blok* (id 467) is gewijzigd: "Geben Sie wieder 2 (zwei) Belüftungen. Legen Sie Ihre Hand sofort wieder etwas unterhalb die Mitte des Brustkorbs und geben Sie 15 (fünfzehn) Brustkompressionen. Abwechselnd 2 (zwei) Belüftungen und 15 (fünfzehn) Brustkompressionen geben. Trennen Sie nicht die Telefonverbindung."
 - *Tekst van blok* (id 468) is gewijzigd: "Indien mogelijk: iedere 2 minuten afwisselen met andere persoon. Als de beademing niet effectief is: geef alleen hartmassages. Beëindig instructie als: professionele hulp het overneemthet kind zelf beweegt, de ogen opent en normaal ademt/huiltde reanimist uitgeput is. Bij Het ROSC terugkeren / van tekenen de van circulatie leven: door alléén beademen en borstcompressies is zeer zeldzaam. Leg het kind dan op de zij. Blijf alert en start zonodig de reanimatie weer op. houd het kind in rugligging houd luchtweg vrij met hoofdkantel- /kinliftmethode controleer voortdurend bewustzijn en ademhaling bij twijfel over ademhaling: start onmiddellijk met reanimatie bij braakneigingen: draai het kind op de zij houd melder aan de lijn totdat

hulp gearriveerd is. Het terugkeren van de circulatie door alléén beademen en borstcompressies is zeer zeldzaam. "

- Startscherm (id 187) is gewijzigd:
 - *Tekst van blok* (id 441) is gewijzigd: "Als melder AED niet direct alleen beschikbaar is: kies 'AED'. Laat iemand AED halenKies 'Melder heeft hulp'Zodra AED beschikbaar is: kies 'AED'. "
 - *Tekst van blok* (id 523) is gewijzigd: "Er komt met spoed een ambulance naar u toe. Verbreek de verbinding niet. We gaan nu starten met reanimeren. Ik ga u instructies geven, luister goed. Zet de telefoon op de speakerstand en leg deze dicht bij het kind. Kunt u reanimeren? Zijn er mensen bij in u de buurt die kunnen reanimeren?[Als melder niet alleen is:] Is reanimeren?Is er een AED direct beschikbaar? diehtbij? "
 - *Tekst van blok* (id 523) is gewijzigd: "An ambulance is on its way to you. Please stay on the phone. We are now going to start CPR. I'm going to give you instructions. Listen carefully. Put the phone on speakermode and place it close to the child. Do you know how to give CPR? Are other people around who can give CPR?[Als melder niet alleen is:] CPR?Is Is there an AED (defibrillator) readily available? nearby? "
 - *Tekst van blok* (id 523) is gewijzigd: "Es kommt mit eile ein Rettungswagen zu Ihnen. Bitte nicht auflegen. Wir werden jetzt mit der Wiederbelebung beginnen. Ich werde Ihnen weitere Instruktionen geben. Hören Sie gut zu. Stellen Sie das Telefon auf freisprechen und legen Sie es in die nähe des Kindes. Können Sie wiederbeleben? Sind in Ihrer Umgebung Menschen die wiederbeleben können?[Als melder niet alleen is:] Ist können?Ist ein Defibrillator sofort in der verfügbar? nähe? "
- Omstandighedenscherm (id 189) is gewijzigd:
 - *Tekst van blok* (id 446) is gewijzigd: "Deze instructie pas uitvoeren zodra AED aanwezig is. ~~Een AED mag gebruikt worden vanaf 1 jaar.~~ Een AED kan zonder bezwaar en op de gebruikelijke manier worden gebruikt in een vochtige omgeving, zoals in de regen of aan de rand van een zwembad. Dan borst droogmaken om elektroden goed te laten plakken. Geef de volgende instructies. "
 - *Tekst van blok* (id 447) is gewijzigd: "Zet de AED aan. Voer de opdrachten van de AED uit. Verbreek de telefoonverbinding niet. Laat u zo mogelijk afwisselen als het apparaat na een 2 analyse minuten uitvoert afwisselen ."
 - *Tekst van blok* (id 447) is gewijzigd: "Turn on the AED ~~and place the electrodes~~ . Perform the AED's ~~voice / visual~~ commands. Do not hang up the phone. If possible, take turns while have the someone device take is over performing after an 2 analysis minutes . "
 - *Tekst van blok* (id 447) is gewijzigd: "Schalten Sie den Defibrillator ein ~~und platzieren Sie die Elektroden~~ . Führen Sie die ~~sprachlichen / visuellen~~ Befehle des Defibrillators aus. Trennen Sie nicht die Telefonverbindung. Wenn möglich, wechseln Sie sich ab, wenn das Gerät nach eine 2 Analyse Minuten durchführt ab . "
 - *Tekst van blok* (id 448) is gewijzigd: "Beëindig instructie als: professionele hulp het overneemthet kind zelf beweegt, de ogen opent, en normaal ademt ademt/huilt. Het en/of terugkeren huilt van de circulatie door alléén beademen en borstecompressies is zeer zeldzaam . Bij ROSC Leg / het tekenen kind van dan leven: op de zij. Blijf alert en start zonodig de reanimatie weer op. houd het kind in rugligging houd luchtweg vrij met hoofdkantel-

/kinliftmethodecontroleer voortdurend bewustzijn en ademhalingbij twijfel over ademhaling: start onmiddellijk met reanimatiebij braakneigingen: draai het kind op de zijlaat de AED aangesloten en aan staanhoud melder aan de lijn totdat hulp gearriveerd is. "

13) Advies "Reanimatie volwassene" is gewijzigd:

- Stappenplan "Instructie" (id 24) is gewijzigd:
 - Stap 'Rugligging' (id 161) is gewijzigd:
 - *Tekst van blok* (id 387) is gewijzigd: "Leg het slachtoffer op de rug ~~op een harde ondergrond~~ . Indien zwanger vanaf 20 weken: leg iets (kussen/jas/handdoek/etc...) onder haar rechterbil zodat deze ca. 10 à 20 cm omhoog komt. "
 - *Tekst van blok* (id 387) is gewijzigd: "Lay the victim on his back ~~on a hard surface~~ . If pregnant from 20 weeks: put something (pillow/coat/towel/etc...) under her right buttock so that it rises about 10-20 cm. "
 - *Tekst van blok* (id 387) is gewijzigd: "Legen Sie das Opfer auf dem Rücken ~~auf eine harte Unterlage~~ . Bei einer Schwangerschaft ab der 20. Woche: Legen Sie etwas (Kissen/Mantel/Handtuch/etc...) unter die rechten Hinterbacke, so dass diese etwa 10-20 cm ansteigt. "
 - Stap 'Borstcompressies continu (lang)' (id 162) is gewijzigd:
 - *Tekst van blok* (id 391) is gewijzigd: "We gaan nu hartmassage geven. Luister goed. Ga op uw knieën zitten ter hoogte van de bovenarm. Zet één hand midden op de borstkas (kleding aanlaten). Zet de andere hand bovenop de eerste. Haak de vingers van beide handen in elkaar. Ga met uw bovenlichaam recht boven uw handen hangen en strek uw armen. ~~Druk Duw~~ de borstkas zo hard als diep je in kan (5 in em) , laat de borstkas weer omhoog komen en laat niet los. Herhaal dit in een tempo van 2 keer per seconde. Ik tel met u mee. U doet het goed. U mag hier pas mee stoppen als (professionele) hulp zegt dat u mag stoppen. "
 - *Tekst van blok* (id 391) is gewijzigd: "We're gonna give CPR (chest compressions) now. Listen carefully. Kneel next to the person's upper arm. Place the palm of one hand in the middle of the victim's chest (leave clothes on). Place your other hand on top of the first. Interlock the fingers of both hands and extend your arms (fingers not flat). Position yourself vertically above your hands. Press down the chest as for hard at as least you 2 can inches / 5 em . Let the chest come back up again; keep your hands on the chest. Keep repeating at a rate of 2 (two) compressions per second. I will help you count. You're doing very well. Keep repeating until (professional) help has arrived. "
 - *Tekst van blok* (id 391) is gewijzigd: "Wir werden jetzt Brustkompressionen geben. Hören Sie gut zu. Knien sie neben dem Opfer im Höhe des Oberarms. Legen Sie eine Hand auf die Mitte des Brustkorbs. (Lass die Kleidung an.) Legen Sie Ihre ander Hand auf die erste Hand. Falten Sie Ihre Finger von beiden Händen in einander. Positionieren Sie sich senkrecht über Ihrer Hand. Strecken Sie die Arme aus (Finger nicht flach). Komprimieren Sie das Brustbein so um fest mindestens wie 5 möglich Centimeter . Bringen Sie den Brustkorb wieder nach oben und bleiben Sie in Kontakt mit dem

Brustkorb. Setzen Sie das so lange im Tempo von 2 (zwei) Mal pro Sekunde. Ich werde mit Ihnen zählen. Sie machen das gut. Mach weiter bis Hilfe bei Ihnen ist. "

- *Tekst van blok* (id 392) is gewijzigd: "Indien mogelijk: iedere 2 minuten afwisselen met andere persoon. Beëindig instructie als: professionele hulp het overneemthet slachtoffer zelf beweegt, ogen opent en/of normaal ademtd reanimist uitgeput is. Bij ROSC / tekenen van leven: instrueer rugligging plus hoofdkantel-/kinliftmethode, voortdurend bewustzijn en ademhaling controleren. Houd melder aan de lijn totdat hulp gearriveerd is. "
- Stap 'Beademing (lang)' (id 163) is gewijzigd:
 - *Tekst van blok* (id 398) is gewijzigd: "We start by giving rescue breaths. Do you still know how to? Place one hand on the forehead and one hand under the chin. Gently tilt the head back by pushing the chin up. Squeeze the victim's nose with 2 (two) fingers of the hand resting on his forehead. Keep the chin up and keep the mouth slightly open. Now first listen carefully to my explanation. Take a normal breath yourself, place your lips around the victim's mouth and ensure an airtight seal. Blow in gently for 1 (one) second as with a normal exhalation. The chest should rise. Remove your mouth from the victim's mouth and see if the chest goes down again. Do you understand? Now give 2 (two) rescue breaths. "
 - *Tekst van blok* (id 398) is gewijzigd: "Wir werden jetzt Belüftung geben. Wissen Sie noch wie? Legen Sie Ihre Hand auf die Stirn und eine Hand unter das Kinn. Neigen Sie den Kopf vorsichtig nach hinten, indem Sie das Kinn nach oben drücken. Quetschen Sie die Nase des Opfers mit 2 (zwei) Fingern aus der Hand, die auf seiner Stirn ruht. Heben Sie das Kinn an und halten Sie den Mund leicht geöffnet. Hören Sie jetzt genau zu. Atmen Sie selbst ganz normal ein, legen Sie Ihre Lippen um den Mund des Opfers und dichten Sie ihn luftdicht ab. Atmen Sie 1 (ein) Sekunde lang sanft aus wie bei einer normaler Atmung. Die Brust soll sich heben. Nehmen Sie Ihren Mund vom Opfer weg und prüfen Sie, ob die Brust wieder nach unten geht. Verstehen Sie? Jetzt geben Sie 2 (zwei) Belüftungen. "
 - *Tekst van blok* (id 399) is gewijzigd: "Als de borstkas niet omhoog komt, dan mondinspectie. Beëindig instructie als: professionele hulp het overneemthet slachtoffer zelf beweegt, de ogen opent en/of normaal ademtd reanimist uitgeput is. Bij ROSC / tekenen van leven: ROSC: instrueer rugligging plus hoofdkantel-/kinliftmethode ehinlift, voortdurend bewustzijn en ademhaling controleren. Houd melder aan de lijn totdat hulp gearriveerd is. "
- Stap 'Borstcompressies (lang)' (id 164) is gewijzigd:
 - *Tekst van blok* (id 395) is gewijzigd: "We gaan nu hartmassage geven. Weet u nog hoe het moet? Ga op uw knieën zitten ter hoogte van de bovenarm. Zet één hand midden op de borstkas (kleding aanlaten). Zet de andere hand bovenop de eerste. Haak de vingers van beide handen in elkaar. Ga met uw bovenlichaam recht boven uw handen hangen en strek uw armen. Druk Duw de borstkas zo hard als diep je in kan (5 in em), laat de borstkas weer omhoog komen en laat niet los. Doe dit 30

keer in een tempo van 2 keer per seconde. Ik tel met u mee. U doet het goed. "

- *Tekst van blok* (id 395) is gewijzigd: "We're gonna give CPR (chest compressions) now. Do you remember how to? Kneel next to the person's upper arm. Place the palm of one hand in the middle of the victim's chest (leave clothes on). Place your other hand on top of the first. Interlock the fingers of both hands and extend your arms (fingers not flat). Position yourself vertically above your hands. Press down the chest **as deeply hard (2 as inches you / can 5 cm)** . Let the chest come back up again; keep your hands on the chest. Keep repeating 30 **(thirty)** times at a rate of 2 **(two)** compressions per second. I will help you count. You're doing very well. "
- *Tekst van blok* (id 395) is gewijzigd: "Wir werden jetzt Brustkompressionen geben. Wissen Sie noch wie? Knien sie neben dem Opfer im Höhe des Oberarms. Legen Sie eine Hand auf die Mitte des Brustkorbs. (Lass die Kleidung an.) Legen Sie Ihre andere Hand auf die erste Hand. Falten Sie Ihre Finger von beiden Händen in einander. Positionieren Sie sich senkrecht über Ihrer Hand. Strecken Sie die Arme aus (Finger nicht flach). Komprimieren Sie das Brustbein **so um fest mindestens wie 5 möglich Centimeter** . Bringen Sie den Brustkorb wieder nach oben und bleiben Sie in Kontakt mit dem Brustkorb. Setzen Sie das 30 **(dreißig)** Mal im Tempo von 2 **(zwei)** Mal pro Sekunde. Ich werde mit Ihnen zählen. Sie machen das gut. "
- *Tekst van blok* (id 396) is gewijzigd: "Indien mogelijk: iedere 2 minuten afwisselen met andere persoon. Beëindig instructie als: professionele hulp het overneemthet slachtoffer zelf beweegt, ogen open en/of normaal ademtde reanimist uitgeput is. Bij **ROSC / tekenen van leven: ROSC:** instrueer rugligging plus **hoofdkantel- /kinliftmethode ehinlift** , voortdurend **bewustzijn en** ademhaling controleren. Houd melder aan de lijn totdat hulp gearriveerd is. "
- Stap 'Borstcompressies + beademing (kort)' (id 165) is gewijzigd:
 - *Tekst van blok* (id 401) is gewijzigd: "Place your hands in the middle of the victim's chest and give 30 **(thirty)** chest compressions. Give 2 **(two)** rescue breaths. Give by turns 30 **(thirty)** compressions and 2 **(two)** rescue breaths. Do not hang up the phone."
 - *Tekst van blok* (id 401) is gewijzigd: "Legen Sie Ihre Hände sofort wieder auf die Mitte des Brustkorbs und geben Sie 30 **(dreißig)** Brustkompressionen. Geben Sie 2 **(zwei)** Belüftungen. Abwechselnd 30 **(dreißig)** Brustkompressionen und 2 **(zwei)** Belüftungen geben. Trennen Sie nicht die Telefonverbindung."
 - *Tekst van blok* (id 402) is gewijzigd: "Indien mogelijk: iedere 2 minuten of na 4 cycli afwisselen met andere persoon. Als de beademing niet effectief is: geef alleen hartmassages. Beëindig instructie als: professionele hulp het overneemthet slachtoffer zelf beweegt, de ogen open en/of normaal ademtde reanimist uitgeput is. Bij **ROSC / tekenen van leven: ROSC:** instrueer rugligging plus **hoofdkantel- /kinliftmethode ehinlift** , voortdurend **bewustzijn en** ademhaling controleren. Houd melder aan de lijn totdat hulp gearriveerd is. "
- Startscherm (id 157) is gewijzigd:

- *Tekst van blok* (id 380) is gewijzigd: "Er komt met spoed een ambulance naar u toe. Verbreek de verbinding niet. We gaan nu starten met reanimeren. Ik ga u instructies geven, luister goed. Zet de telefoon op de speakerstand en leg deze dicht bij het slachtoffer. Kunt u reanimeren? Zijn er mensen **bij in u de buurt** die kunnen reanimeren? Is er een AED **direct beschikbaar? dichtbij?** "
- *Tekst van blok* (id 380) is gewijzigd: "An ambulance is on its way to you. Please stay on the phone. We are now going to start CPR. I'm going to give you instructions. Listen carefully. Put the phone on speaker mode and place it close to the victim. Do you know how to give CPR? Are other people around who can give CPR? Is there an AED (defibrillator) **readily available? nearby?** "
- *Tekst van blok* (id 380) is gewijzigd: "Es kommt mit eile ein Rettungswagen zu Ihnen. Bitte nicht auflegen. Wir werden jetzt mit der Wiederbelebung beginnen. Ich werde Ihnen weitere Instruktionen geben. Hören Sie gut zu. Stellen Sie das Telefon auf freisprechen und legen Sie es in die nähe des Opfers. Können Sie wiederbeleben? Sind in Ihrer Umgebung Menschen die wiederbeleben können? Ist ein Defibrillator **sofort in verfügbar? der nähe?** "
- *Tekst van blok* (id 381) is gewijzigd: "Als AED **binnen 1 minuut direct** beschikbaar is: kies 'AED'. "
- Omstandighedenschermblok (id 166) is gewijzigd:
 - *Tekst van blok* (id 404) is gewijzigd: "Let op! Wordt er een **rechtsgeldige** niet-reanimerenverklaring van het slachtoffer aangetroffen? Ja: stop reanimatie-instructie Nee / onzeker / weet niet: continueer reanimatie-instructie. Mensen kunnen ervoor kiezen een niet-reanimerenverklaring op te stellen. Deze moet aan een aantal eisen voldoen: de wilsverklaring moet geschreven zijn en te herleiden zijn tot de persoon die de verklaring uitte. De verklaring kan op papier staan en kan ook een penning zijn. Een niet-reanimeren-verklaring moet gerespecteerd worden als dit voor het begin van de reanimatie duidelijk is. Maar hulpverleners moeten bij iemand met een circulatiestilstand niet op zoek gaan naar een geschreven wilsverklaring of een niet-reanimerenpenning. Zo wordt voorkomen dat de reanimatiepoging wordt uitgesteld en de uitkomst van de reanimatie nadelig wordt beïnvloed. Een niet-reanimerenpenning wordt bij het begin van een reanimatie soms niet opgemerkt, omdat de borstkas van het slachtoffer bij basale reanimatie niet hoeft te worden ontbloot. Ook als dat wel het geval is, kan de penning onopgemerkt blijven als deze naar de nek of rug is verschoven. Met name bij de burgerhulpverleners kan verwarring ontstaan als later tijdens de reanimatie de niet-reanimerenwens duidelijk wordt, bijvoorbeeld als de borstkas wordt ontbloot om de elektroden van de AED aan te brengen. De burgerhulpverlener mag zijn reanimatiepoging dan staken, maar kan het besluit om te staken ook overlaten aan de professionele hulpverlener, die naar verwachting enkele minuten later zal arriveren. "
- Omstandighedenschermblok (id 167) is gewijzigd:
 - *Tekst van blok* (id 406) is gewijzigd: "Zet de AED aan. Voer de opdrachten van de AED uit. Verbreek de telefoonverbinding niet. Laat u zo mogelijk **afwisselen als het apparaat na een 2 analyse minuten uitvoert afwisselen** ."
 - *Tekst van blok* (id 406) is gewijzigd: "Turn on the AED **and place the electrodes** . Perform the AED's **voice/ visual** commands. Do not hang up the phone. If possible, **take turns while have the someone device take is over performing after an 2 analysis minutes** . "
 - *Tekst van blok* (id 406) is gewijzigd: "Schalten Sie den Defibrillator ein **und platzieren Sie die Elektroden** . Führen Sie die **sprachlichen / visuellen** Befehle

des Defibrillators aus. Trennen Sie nicht die Telefonverbindung. Wenn möglich, wechseln Sie sich ab, wenn das nach Gerät eine 2 Analyse Minuten durchführt ab . - "

- o *Tekst van blok* (id 407) is gewijzigd: "Beëindig instructie als: professionele hulp het overneemt als het slachtoffer beweegt, de ogen open en/of normaal ademt. Bij ROSC / tekenen van leven: ROSC: instrueer Instrueer rugligging plus hoofdkantel-/kinliftmethode chinlift, voortdurend bewustzijn en ademhaling controleren. Houd melder aan de lijn totdat hulp gearriveerd is. Laat de AED aangesloten en aan staan . "

Ingangsklachten

14) Ingangsklacht "Algehele malaise volwassene" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor urgentiecategorie toegevoegd:
 - o advies 'U2'
 - o voor triagetype 'Alle'
 - o en 'Zieke indruk volwassene' \geq 'Ja'
 - o en 'Verward gedrag' \geq 'Ja'
- Nieuw dynamisch triagecriterium toegevoegd: 'Verward gedrag' alleen tonen indien 'Zieke indruk volwassene' \geq 'Ja'

15) Ingangsklacht "Braken" is gewijzigd:

- Bij voorwaarden voor urgentiecategorie met advies 'U3' voor triagetype 'Alle' (id 905) het triagecriterium 'Anders ziek dan anders' \geq 'Ja' toegevoegd
- Bij voorwaarden voor urgentiecategorie met advies 'U2' voor triagetype 'Alle' (id 967) het triagecriterium 'Type diabetes' \geq 'Diabetes type 2' toegevoegd
- Nieuwe voorwaarde voor advies vervolgactie toegevoegd:
 - o advies 'SEH'
 - o en 'Type diabetes' \geq 'Onbekend'
- Nieuw dynamisch triagecriterium toegevoegd: 'Anders ziek dan anders' alleen tonen indien 'Zieke indruk kind' \geq 'Ja'
- Nieuw dynamisch triagecriterium toegevoegd: 'Type diabetes' alleen tonen indien 'Diabetes' \geq 'Ja'

16) Ingangsklacht "Breathing" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
 - o advies 'Kortademig, urgent'
 - o en 'Kortademig, ernst' \geq 'Matig'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
 - o advies 'Contactadvies kortademig hoogurgent'
 - o en 'Kortademig, ernst' \geq 'Matig'

17) Ingangsklacht "Buikpijn kind" is gewijzigd:

- Bij voorwaarden voor urgentiecategorie met advies 'U3' voor triagetype 'Alle' (id 818) het triagecriterium 'Anders ziek dan anders' \geq 'Ja' toegevoegd

- Nieuw dynamisch triagecriterium toegevoegd: 'Anders ziek dan anders' alleen tonen indien 'Zieke indruk kind' \geq 'Ja'

18) Ingangsklacht "Buikpijn volwassene" is gewijzigd:

- Gerelateerde ingangsklacht "Zwangerschap en partus" is toegevoegd.

19) Ingangsklacht "Diabetes" is gewijzigd:

- Bij voorwaarden voor urgentiecategorie met advies 'U2' voor triagetype 'Alle' (id 58) het triagecriterium 'Type diabetes' \geq 'Diabetes type 2' toegevoegd
- Bij voorwaarden voor urgentiecategorie met advies 'U2' voor triagetype 'Alle' (id 59) het triagecriterium 'Type diabetes' \geq 'Diabetes type 2' toegevoegd
- Bij voorwaarden voor urgentiecategorie met advies 'U2' voor triagetype 'Alle' (id 60) het triagecriterium 'Type diabetes' \geq 'Diabetes type 2' toegevoegd
- Bij voorwaarden voor urgentiecategorie met advies 'U2' voor triagetype 'Alle' (id 61) het triagecriterium 'Type diabetes' \geq 'Diabetes type 2' toegevoegd
- Bij voorwaarden voor urgentiecategorie met advies 'U2' voor triagetype 'Telefonisch' (id 451) het triagecriterium 'Type diabetes' \geq 'Diabetes type 2' toegevoegd
- Bij voorwaarden voor urgentiecategorie met advies 'U2' voor triagetype 'Telefonisch' (id 451) triagecriterium gewijzigd naar 'Insuline' \geq 'Verkeerde dosering' (was 'Insuline' = 'Verkeerde dosering')
- Bij voorwaarden voor urgentiecategorie met advies 'U2' voor triagetype 'Alle' (id 486) het triagecriterium 'Type diabetes' \geq 'Diabetes type 2' toegevoegd
- Bij voorwaarden voor urgentiecategorie met advies 'U2' voor triagetype 'Alle' (id 486) triagecriterium gewijzigd naar 'Braken' \geq 'Aanhoudend' (was 'Braken' = 'Aanhoudend')
- Bestaande voorwaarde voor urgentiecategorie verwijderd:
 - advies 'U2'
 - voor triagetype 'Alle'
 - en 'Type diabetes' \geq 'Onbekend'
- Nieuw dynamisch triagecriterium toegevoegd: 'Type diabetes' alleen tonen indien 'AVPU' \geq 'V/verbale reactie'
- Nieuw dynamisch triagecriterium toegevoegd: 'Type diabetes' alleen tonen indien 'Glucose' \geq ' $\leq 3,9$ mmol/l'
- Nieuw dynamisch triagecriterium toegevoegd: 'Type diabetes' alleen tonen indien 'Vreemd gedrag' \geq 'Ja'
- Nieuw dynamisch triagecriterium toegevoegd: 'Type diabetes' alleen tonen indien 'Insuline' \geq 'Verkeerde dosering'
- Nieuw dynamisch triagecriterium toegevoegd: 'Type diabetes' alleen tonen indien 'Braken' \geq 'Aanhoudend'

20) Ingangsklacht "Diarree" is gewijzigd:

- Bij voorwaarden voor urgentiecategorie met advies 'U3' voor triagetype 'Alle' (id 819) het triagecriterium 'Anders ziek dan anders' \geq 'Ja' toegevoegd
- Nieuw dynamisch triagecriterium toegevoegd: 'Anders ziek dan anders' alleen tonen indien 'Zieke indruk kind' \geq 'Ja'

21) Ingangsklacht "Duizelig" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
 - advies 'Contactadvies duizelig hoogurgent'
 - indien 'U1'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
 - advies 'Contactadvies duizelig hoogurgent'
 - indien 'U2'

22) Ingangsklacht "Hartkloppingen" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor urgentiecategorie toegevoegd:
 - advies 'U1'
 - voor triagetype 'Alle'
 - en 'Overdosis toxische middelen (geen alcohol)' \geq 'Ja, <60 minuten'
- Nieuwe voorwaarde voor urgentiecategorie toegevoegd:
 - advies 'U2'
 - voor triagetype 'Alle'
 - en 'Overdosis toxische middelen (geen alcohol)' \geq 'Ja, >60 minuten'
- Nieuwe voorwaarde voor urgentiecategorie toegevoegd:
 - advies 'U2'
 - voor triagetype 'Alle'
 - en 'AVPU' \geq 'V/verbale reactie'
 - en 'Alcohol of drugs' \geq 'Ja'
- Nieuwe voorwaarde voor urgentiecategorie toegevoegd:
 - advies 'U2'
 - voor triagetype 'Alle'
 - en 'Hartkloppingen' \geq 'Ja'
 - en 'Alcohol of drugs' \geq 'Ja'

23) Ingangsklacht "Hoesten" is gewijzigd:

- Bij voorwaarden voor urgentiecategorie met advies 'U3' voor triagetype 'Alle' (id 821) het triagecriterium 'Anders ziek dan anders' \geq 'Ja' toegevoegd
- Nieuw dynamisch triagecriterium toegevoegd: 'Anders ziek dan anders' alleen tonen indien 'Zieke indruk kind' \geq 'Ja'

24) Ingangsklacht "Hoofdpijn" is gewijzigd:

- Bij voorwaarden voor urgentiecategorie met advies 'U3' voor triagetype 'Alle' (id 824) het triagecriterium 'Anders ziek dan anders' \geq 'Ja' toegevoegd
- Nieuw dynamisch triagecriterium toegevoegd: 'Anders ziek dan anders' alleen tonen indien 'Zieke indruk kind' \geq 'Ja'

25) Ingangsklacht "Huidklachten/borstontsteking" is gewijzigd:

- Bestaande voorwaarden voor urgentiecategorie gewijzigd:
 - advies 'U4' (was 'U3')
 - en 'Borstontsteking' = 'Ja'
- Bij voorwaarden voor urgentiecategorie met advies 'U3' voor triagetype 'Alle' (id 827) het triagecriterium 'Anders ziek dan anders' \geq 'Ja' toegevoegd

- Nieuw dynamisch triagecriterium toegevoegd: 'Anders ziek dan anders' alleen tonen indien 'Zieke indruk kind' \geq 'Ja'

26) Ingangsklacht "Intoxicatie" is gewijzigd:

- Bij voorwaarden voor urgentiecategorie met advies 'U1' voor triagetype 'Alle' (id 366) het triagecriterium 'Inhalatietrauma / inhalatie gevaarlijke stoffen' \geq 'Ja/waarschijnlijk' toegevoegd
- Bij voorwaarden voor urgentiecategorie met advies 'U1' voor triagetype 'Alle' (id 366) het triagecriterium 'Inhalatie gevaarlijke stoffen' = 'Ja, waarschijnlijk' verwijderd
- Bestaande voorwaarde voor urgentiecategorie verwijderd:
 - advies 'U1'
 - voor triagetype 'Alle'
 - en 'Landbouwgif' = 'Ja'
- Bij voorwaarden voor weergave advies 'Inhalatietrauma' (id 65) het triagecriterium 'Inhalatietrauma / inhalatie gevaarlijke stoffen' \geq 'Ja/waarschijnlijk' toegevoegd
- Bij voorwaarden voor weergave advies 'Inhalatietrauma' (id 65) het triagecriterium 'Inhalatie gevaarlijke stoffen' \geq 'Ja, waarschijnlijk' verwijderd

27) Ingangsklacht "Keelklachten" is gewijzigd:

- Bij voorwaarden voor urgentiecategorie met advies 'U3' voor triagetype 'Alle' (id 849) het triagecriterium 'Anders ziek dan anders' \geq 'Ja' toegevoegd
- Nieuw dynamisch triagecriterium toegevoegd: 'Anders ziek dan anders' alleen tonen indien 'Zieke indruk kind' \geq 'Ja'

28) Ingangsklacht "Koorts volwassene" is gewijzigd:

- *Trefwoorden* zijn gewijzigd: "infectie, griep, febris, koude rilling, malaria, zonnesteek"
- Nieuwe voorwaarde voor urgentiecategorie toegevoegd:
 - advies 'U2'
 - voor triagetype 'Alle'
 - en 'Verward gedrag' \geq 'Ja'
- Bestaande voorwaarde voor urgentiecategorie verwijderd:
 - advies 'U3'
 - voor triagetype 'Alle'
 - en 'Kraambed' = 'Ja'

29) Ingangsklacht "Kortademig" is gewijzigd:

- Bij voorwaarden voor urgentiecategorie met advies 'U3' voor triagetype 'Alle' (id 833) het triagecriterium 'Anders ziek dan anders' \geq 'Ja' toegevoegd
- Nieuw dynamisch triagecriterium toegevoegd: 'Anders ziek dan anders' alleen tonen indien 'Zieke indruk kind' \geq 'Ja'

30) Ingangsklacht "Kraamvrouw" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor urgentiecategorie toegevoegd:
 - advies 'U3'

- voor triagetype 'Alle'
 - en 'Zieke indruk volwassene' \geq 'Ja'
- Bestaande voorwaarde voor urgentiecategorie verwijderd:
 - advies 'U2'
 - voor triagetype 'Alle'
 - en 'Abnormaal ongerust' \geq 'Ja'
- Nieuw dynamisch triagecriterium toegevoegd: 'Shockverschijnselen' alleen tonen indien 'Vaginaal bloedverlies' \geq 'Ruim'

31) Ingangsklacht "Nekklachten" is gewijzigd:

- Bij voorwaarden voor urgentiecategorie met advies 'U3' voor triagetype 'Alle' (id 1013) het triagecriterium 'Anders ziek dan anders' \geq 'Ja' toegevoegd
- Nieuw dynamisch triagecriterium toegevoegd: 'Anders ziek dan anders' alleen tonen indien 'Zieke indruk kind' \geq 'Ja'

32) Ingangsklacht "Oogklachten" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor urgentiecategorie toegevoegd:
 - advies 'U3'
 - voor triagetype 'Alle'
 - en 'Vlek(ken) in gezichtsveld' \geq 'Ernstig'
- Bestaande voorwaarde voor urgentiecategorie verwijderd:
 - advies 'U3'
 - voor triagetype 'Alle'
 - en 'Meebewegende vlekken' \geq 'Ja'
- Nieuwe voorwaarde voor advies vervolgactie toegevoegd:
 - advies 'HA'
 - en 'Dubbelzien' \geq 'Ja, acuut ontstaan'
- Nieuwe voorwaarde voor advies vervolgactie toegevoegd:
 - advies 'HA'
 - en 'Acute visusdaling' \geq 'Wazig zien'
 - en 'Braken' \geq 'Ja'
 - en 'Pijnlijk oog' \geq 'Gering (1-4)'
- Nieuwe voorwaarde voor advies vervolgactie toegevoegd:
 - advies 'HA'
 - en 'Acute fotofobie' \geq 'Ja'
 - en 'Pijnlijk oog' \geq 'Hevig (8-10)'
- Nieuwe voorwaarde voor advies vervolgactie toegevoegd:
 - advies 'HA'
 - en 'Corpus alienum' \geq 'Ja'
 - en 'Pijnlijk oog' \geq 'Gering (1-4)'

33) Ingangsklacht "Oorklachten" is gewijzigd:

- Bestaande voorwaarden voor urgentiecategorie gewijzigd:
 - advies 'U4' (was 'U3')
 - en 'Oorpijn, dubbelzijdig' = 'Ja'
- Bij voorwaarden voor urgentiecategorie met advies 'U3' voor triagetype 'Alle' (id 911) het triagecriterium 'Anders ziek dan anders' \geq 'Ja' toegevoegd

- Nieuw dynamisch triagecriterium toegevoegd: 'Anders ziek dan anders' alleen tonen indien 'Zieke indruk kind' \geq 'Ja'

34) Ingangsklacht "Rugpijn" is gewijzigd:

- Bestaande voorwaarde voor urgentiecategorie verwijderd:
 - advies 'U4'
 - voor triagetype 'Alle'
 - en 'Uitstraling rugpijn' \geq 'Ja, voorbij de knie'

35) Ingangsklacht "Trauma extremiteit" is gewijzigd:

- Bij voorwaarden voor urgentiecategorie met advies 'U2' voor triagetype 'Alle' (id 225) triagecriterium gewijzigd naar 'Stand' \geq 'Abnormaal onderarm/pols' (was 'Stand' = 'Abnormaal')
- Nieuwe voorwaarde voor advies vervolgactie toegevoegd:
 - advies 'HA'
 - en 'Stand' = 'Abnormaal onderarm/pols'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
 - advies 'Trauma vinger/teen'
 - indien 'U2'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
 - advies 'Trauma vinger/teen'
 - indien 'U3'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
 - advies 'Trauma vinger/teen'
 - indien 'U4'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
 - advies 'Trauma vinger/teen'
 - indien 'U5'

36) Ingangsklacht "Trauma nek" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor urgentiecategorie toegevoegd:
 - advies 'U2'
 - voor triagetype 'Fysiek'
 - en 'Trauma - fysieke triage' \geq 'HET niet acuut'
 - en 'HET <2 uur geleden' \geq 'Ja'
- Nieuwe voorwaarde voor urgentiecategorie toegevoegd:
 - advies 'U2'
 - voor triagetype 'Telefonisch'
 - en 'Trauma' \geq 'HET niet meer ter plaatse'
 - en 'HET <2 uur geleden' \geq 'Ja'
- Nieuwe voorwaarde voor advies vervolgactie toegevoegd:
 - advies 'HA'
 - en 'HET <2 uur geleden' \geq 'Ja'
 - en 'Trauma' \geq 'HET niet meer ter plaatse'
- Nieuw dynamisch triagecriterium toegevoegd: 'HET <2 uur geleden' alleen tonen indien 'Trauma' \geq 'HET niet meer ter plaatse'

- Nieuw dynamisch triagecriterium toegevoegd: 'HET <2 uur geleden' alleen tonen indien 'Trauma - fysieke triage' \geq 'HET niet acuut'

37) Ingangsklacht "Trauma schedel" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor urgentie categorie toegevoegd:
 - advies 'U2'
 - voor triagetype 'Telefonisch'
 - en 'Trauma' \geq 'HET niet meer ter plaatse'
 - en 'HET <2 uur geleden' \geq 'Ja'
- Nieuwe voorwaarde voor urgentie categorie toegevoegd:
 - advies 'U2'
 - voor triagetype 'Fysiek'
 - en 'Trauma - fysieke triage' \geq 'HET niet acuut'
 - en 'HET <2 uur geleden' \geq 'Ja'
- Bestaande voorwaarden voor urgentie categorie gewijzigd:
 - advies 'U2' (was 'U1')
 - en 'Insult na trauma' \geq 'Ja'
- Nieuwe voorwaarde voor advies vervolgactie toegevoegd:
 - advies 'HA'
 - en 'HET <2 uur geleden' \geq 'Ja'
 - en 'Trauma' \geq 'HET niet meer ter plaatse'
- Nieuw dynamisch triagecriterium toegevoegd: 'HET <2 uur geleden' alleen tonen indien 'Trauma' \geq 'HET niet meer ter plaatse'
- Nieuw dynamisch triagecriterium toegevoegd: 'HET <2 uur geleden' alleen tonen indien 'Trauma - fysieke triage' \geq 'HET niet acuut'

38) Ingangsklacht "Vreemd gedrag of suïcidaal" is gewijzigd:

- *Trefwoorden* zijn gewijzigd: "verward, psychose, delier, hallucinatie, waan, schizofreen, geheugenverlies, depressie, zelfmoord, ts, suicide, suïcide, vreemd, onsamenvattend, inspanningsgebonden hitte beroerte, IHB, ihb, hitte, "

39) Ingangsklacht "Wond" is gewijzigd:

- Bij voorwaarden voor urgentie categorie met advies 'U3' voor triagetype 'Alle' (id 1122) het triagecriterium 'Anders ziek dan anders' \geq 'Ja' toegevoegd
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
 - advies 'Trauma vinger/teen'
 - indien 'U4'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
 - advies 'Trauma vinger/teen'
 - indien 'U5'
- Gerelateerde ingangsklacht "Trauma extremiteit" is toegevoegd.
- Nieuw dynamisch triagecriterium toegevoegd: 'Anders ziek dan anders' alleen tonen indien 'Zieke indruk kind' \geq 'Ja'

40) Ingangsklacht "Ziek kind / koorts kind" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor urgentie categorie toegevoegd:

- advies 'U1'
 - voor triagetype 'Alle'
 - en 'Zieke indruk kind' \geq 'Ernstig'
 - en 'Verward gedrag' \geq 'Ja'
- Nieuwe voorwaarde voor urgentiecategorie toegevoegd:
 - advies 'U1'
 - voor triagetype 'Alle'
 - en 'Verward gedrag' \geq 'Ja'
 - en 'Koorts' \geq 'Vermoedelijk wel'
 - en 'Petechiën/purpura' \geq 'Ja'
- Nieuwe voorwaarde voor urgentiecategorie toegevoegd:
 - advies 'U2'
 - voor triagetype 'Alle'
 - en 'Verward gedrag' \geq 'Ja'
- Bij voorwaarden voor urgentiecategorie met advies 'U3' voor triagetype 'Alle' (id 292) het triagecriterium 'Anders ziek dan anders' \geq 'Ja' toegevoegd
- Bestaande voorwaarde voor urgentiecategorie verwijderd:
 - advies 'U1'
 - voor triagetype 'Alle'
 - en 'Apathisch na dyspneu' \geq 'Ja'
- Nieuw dynamisch triagecriterium toegevoegd: 'Anders ziek dan anders' alleen tonen indien 'Zieke indruk kind' \geq 'Ja'

Locaties

Er zijn geen wijzigingen.

Redenen afbreken triage

Er zijn geen wijzigingen.

Triagecriteria

- 41) Triagecriterium "Anders ziek dan anders" is toegevoegd.
- 42) Triagecriterium "HET <2 uur geleden" is toegevoegd.
- 43) Triagecriterium "Verward gedrag" is toegevoegd.
- 44) Triagecriterium "Aanhoudende hoofdpijn bij zwangerschap" is gewijzigd:
 - *Relevant vanaf* is gewijzigd van "10 jaar" naar ""
 - *Relevant tot* is gewijzigd van "55 jaar" naar ""
- 45) Triagecriterium "Aantal benen dik of rood" is gewijzigd:
 - *Relevant vanaf* is gewijzigd van "12 jaar" naar ""

46) Triagecriterium "Abnormaal ongerust" is gewijzigd:

- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "12 jaar" naar ""

47) Triagecriterium "Afscheiding" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Abnormale ~~abnormale~~ afscheiding vagina of penis "

48) Triagecriterium "Afwijkende ligging" is gewijzigd:

- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "12 jaar" naar ""

49) Triagecriterium "Alcohol of drugs" is gewijzigd:

- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "12 jaar" naar ""

50) Triagecriterium "Arm, rood of dik" is gewijzigd:

- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "12 jaar" naar ""

51) Triagecriterium "AVPU" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "A = Volledig wakker, reageert ~~Alerte~~ spontaan ~~reactie~~ V = Reageert alleen ~~Reactie~~ op aanspreken en niet spontaan op de omgeving P = Alleen ~~reactie~~ Reactie op een schudden duidelijke of pijnprikkel pijn U = Unresponsive / bewusteloos; geen reactie op verbale of en pijnprikkels. ~~bewusteloos~~ "
- *Ondersteuningsvragen* is gewijzigd: "NL: NL-Volwassene: Is de patiënt goed wakker? Reageert hij normaal? ~~alert?~~ Reageert hij op aanspreken? Reageert hij op de omgeving? ~~schudden?~~ Is hij bewusteloos? EN: EN-Volwassene: Is the patient fully awake? Is Does he responding normally? Is he respond responding to when being spoken to? Is Does he responding respond to his being surroundings? ~~shaken?~~ Is he unconscious? DU: DU-Volwassene: Ist der Patient bei Bewußtsein? Reagiert er normal? aufmerksam? Reagiert er, wenn man ihn auf anspricht? ansprechen? Reagiert er auf seine Umgebung? ~~rütteln?~~ Ist er bewußtlos? ~~bewusstlos?~~ "

52) Triagecriterium "Bevalling zonder verloskundig hulpverlener" is gewijzigd:

- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "12 jaar" naar ""

53) Triagecriterium "Bijt-wond" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Bijt-wond door giftig dier, zoals: slangspinhagedis. ~~Denk aan tetanus.~~ Er is geen éénduidige urgentie te geven, aangezien de giftigheid sterk verschilt tussen de verschillende giftige dieren. Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): www.vergiftigingen.info of 088-7558000. Denk aan tetanus / rabiës bij beten door oa mensen, honden, apen en vleermuizen. "

54) Triagecriterium "Brandblaar, grootte" is gewijzigd:

- Antwoorden zijn gewijzigd

55) Triagecriterium "Buikpijn" is gewijzigd:

- *Ondersteuningsvragen* is gewijzigd: "Is er buikpijn? ~~Kunt u vertellen hoe erg de buikpijn is (pijnladder)?~~ Wat kunt u nog wel doen? Wat kunt u niet meer door de pijn?"

56) Triagecriterium "Buikpijn bij zwangerschap" is gewijzigd:

- *Ondersteuningsvragen* is gewijzigd: "Heeft u pijn? pijn, hoe erg (pijnladder)? Wat kunt u nog wel doen? Wat kunt u niet meer door de pijn?"
- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "12 jaar" naar ""

57) Triagecriterium "Diabetes + braken/diarree" is gewijzigd:

- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "12 jaar" naar ""

58) Triagecriterium "Dreigende dehydratie" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Jonger dan 2 jaar of ouder dan 70 jaar Aanwijzingen voor dreigende dehydratie: 1 dag frequente (>6dd) waterdunne diarree 1 dag waterdunne diarree en koorts 1 dag frequent braken minder dan 2x plassen per 24 uur braken .2 - 70 jaar Aanwijzingen voor dreigende dehydratie: 3 dagen frequente (>6 dd) waterdunne diarree waterdunne diarree en 3 dagen koortsfrequente waterdunne diarree met minimale vochtopname en opvallende dorst minder dan 2x plassen per 24 uur ~~dorst~~ . "
- *Ondersteuningsvragen* is gewijzigd: "Is er diarree? Sinds wanneer? Hoe vaak per dag? Hoe dun is de diarree? Is er koorts? Braakt u? Sinds wanneer? Hoe vaak per dag? Hoe vaak is er in de afgelopen 24 uur geplast? "

59) Triagecriterium "Dubbelzien" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Dubbelzien met beide ogen i.c.m. andere neurologische uitvalsverschijnselen is verdacht voor neurologische uitval: neem ~~overweeg~~ de ingangsklacht 'Neurologische uitval' . "

60) Triagecriterium "Ernst pijn/druk thorax" is gewijzigd:

- *Ondersteuningsvragen* is gewijzigd: "Heeft u pijn of druk in of aan de borstkas? ~~Hoe erg (pijnladder)?~~ Wat kunt u nog wel doen? Wat kunt u niet meer door de pijn?"
- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "" naar "2 jaar"

61) Triagecriterium "Geplast binnen 6 uur post partum" is gewijzigd:

- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "10 jaar" naar ""
- *Relevant tot* is gewijzigd van "55 jaar" naar ""

62) Triagecriterium "Harde buiken" is gewijzigd:

- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "12 jaar" naar ""

63) Triagecriterium "HET" is gewijzigd:

- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "12 jaar" naar ""

64) Triagecriterium "Hoofdpijn" is gewijzigd:

- *Ondersteuningsvragen* is gewijzigd: "Heeft Hoe u erg is hoofdpijn? de hoofdpijn (pijn ladder)? Wat kunt u nog wel doen? Wat kunt u niet meer door de pijn?"

65) Triagecriterium "Hoofdpijn + visusklachten/tintelingen" is gewijzigd:

- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "12 jaar" naar ""

66) Triagecriterium "Hoofdpijn die niet reageert op pijnstilling" is gewijzigd:

- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "10 jaar" naar ""
- *Relevant tot* is gewijzigd van "55 jaar" naar ""

67) Triagecriterium "Hoogstaand voorliggend deel" is gewijzigd:

- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "12 jaar" naar ""

68) Triagecriterium "In paniek" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Toestand van extreme angst en/of radeloosheid. "

69) Triagecriterium "Inhalatietrauma" is gewijzigd:

- *Naam* is gewijzigd van "Inhalatietrauma" naar "Inhalatietrauma / inhalatie gevaarlijke stoffen"
- *Omschrijving* is gewijzigd: "Inhalatietrauma is het gevolg van het inademen van hitte, rook en/of giftige stoffen. Inademing van gassen, dampen, rook of koolmonoxide kan groot gevaar opleveren voor de ademhaling of de ademweg. Mogelijke symptomen zijn: kortademigheidzwakke stemschorre stemschor klinkende hoestroet in neus en/of mond.Mogelijke symptomen van koolmonoxide zijn: hoofdpijnmisselijkheidbrakenduizeligheidvermoeidheidwazig zienbewustzijnsverliescoma.Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): www.vergiftigingen.info of 088-7558000. "
- *Ondersteuningsvragen* is gewijzigd: "Wat Zijn heeft er de mogelijk patiënt gevaarlijke gassen vrijgekomen die zijn ingeademd?"
- Antwoorden zijn gewijzigd

70) Triagecriterium "Insult na trauma" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Insult Bewusteloosheid gehad gepaard gaand met trekkingen na een schedeltrauma. "

71) Triagecriterium "Jeuk aan handpalmen/voetzolen" is gewijzigd:

- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "12 jaar" naar ""

72) Triagecriterium "Koorts post partum" is gewijzigd:

- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "10 jaar" naar ""
- *Relevant tot* is gewijzigd van "55 jaar" naar ""

73) Triagecriterium "Kortademig, ernst" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Ademt Een niet/nauwelijks (te = snelle) Onregelmatig ademhaling die happen veel inspanning naar kost of het gevoel van te weinig lucht, met binnen pauzes, te krijgen, zonder Moeite borstkasbeweging met ademen. Hevig = Kan geen 5 woorden achtereen zeggen zonder naar lucht te happen. Moet rechtop zitten (kan niet liggen door de kortademigheid). Kind: steunende, kreunende ademhaling betekent hevig kortademig. Matig = Gebruik van hulpademhalingspiers. Kan niet meer dan een aantal meters lopen zonder op adem te moeten komen. Gering = (gevoel van) lichte benauwdheid, geen gebruik van hulpademhalingspiers
Normale ademprequentie in rust per minuut: ≥ 12 ≥ 12 jaar: 15-20-12 jaar: 20-25-5 jaar: 25-30-1-2 jaar: $25-35 < 25-35 < 1$ \dagger jaar: 30-40 "
- *Ondersteuningsvragen* is gewijzigd: "NL Volwassene: Hoe Is er een snelle ademhaling? Heeft de patiënt het gevoel te weinig lucht te krijgen? Kan de patiënt nog in zinnen spreken of alleen een paar woorden? Hoort u reutelen, pruttelen of rochelen? Zijn er tekenen van intrekkingen (extra ademarbeid)? Wat is de ademhaling? voorkeurshouding? NL Kind: Is is de ademhaling anders dan u van het kind gewend bent? Heeft het kind een steunende, kreunende ademhaling? Trekt het de ribben en middenrif in. En spert het de neus open bij het ademen? EN Volwassene: Is the breathing faster? Does the patient feel that he/she is not getting enough air? Can the patient still speak whole sentences or just a few words? Do you hear rattling, simmering or gurgling? What is the breathing preferred like? position? EN Kind: is the breathing of the child different from what you are used to? Is the child groaning when breathing? Does the child retract the ribs and diaphragm? Does it open the nostrils when breathing? DU Volwassene: Wie Ist die Atmung schneller? Hat der Patient das Gefühl, zu wenig Luft zu bekommen? Kann der Patient noch ganze Sätze sprechen oder nur wenige Wörter? Hören Sie Rasseln, Brodeln oder Röcheln? Gibt es zusätzliche Atemarbeit (Einsatz der Atemhilfsmuskulatur)? Was ist die Atmung? bevorzugte Haltung? DU Kind: Ist die Atmung anders, als Sie es vom Kind gewohnt sind? Hat das Kind eine stöhnende Atmung? Zieht es die Rippen und das Zwerchfell ein. Bewegen die Naseflügel beim Atmen? "

74) Triagecriterium "Maagpijn" is gewijzigd:

- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "10 jaar" naar ""
- *Relevant tot* is gewijzigd van "55 jaar" naar ""

75) Triagecriterium "Meebewegende vlekken" is gewijzigd:

- *Naam* is gewijzigd van "Meebewegende vlekken" naar "Vlek(ken) in gezichtsveld"
- *Omschrijving* is gewijzigd: "Ernstig: Kleine netvliesloslating pluisjes, puntjes of draadjes zijn niet ernstig. Een meebewegende vlek (of meerdere meebewegende vlekken) kan mogelijk ernstig zijn. Omschreven als: "Het voelt alsof er een gordijn of donkere schaduw voor mijn oog schuift." Beweging: die schaduw blijft op dezelfde plek in je gezichtsveld, ook als je je ogen beweegt. Het beweegt dus niet losjes mee zoals een vliegje, maar zit vastgeplakt aan een deel van je zicht. Toename: de schaduw kan groter worden, alsof het gordijn verder dichtgaat Niet ernstig: mouches

volantes - Omschreven als: "Het lijkt alsof er vliegjes of sliertjes in mijn oog drijven." Beweging: de vlekjes zweven langzaam mee als je je oog beweegt, en lijken nog even door te drijven voordat ze stilvallen Kenmerk: losse zwevende dingetjes die je vooral ziet tegen een lichte achtergrond (blauwe lucht, witte muur) Constante plek: veranderen niet in een vaste schaduw, maar blijven zweven en verschuiven. "

- *Ondersteuningsvragen* is gewijzigd: "Wat ziet u precies? ~~Zijn het kleine pluisjes, puntjes of draadjes?~~ Wanneer u naar 1 punt kijkt, beweegt de vlek dan mee of staat deze stil? "
- Antwoorden zijn gewijzigd

76) Triagecriterium "Mictieklachten vrouw" is gewijzigd:

- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "12 jaar" naar "10 jaar"

77) Triagecriterium "Oedeem in gezicht en handen/voeten" is gewijzigd:

- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "10 jaar" naar ""
- *Relevant tot* is gewijzigd van "55 jaar" naar ""

78) Triagecriterium "Ongecontroleerde zwangerschap" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "De zwangerschap is niet of niet regulier door een professional gecontroleerd. "
- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "12 jaar" naar ""

79) Triagecriterium "Ontstaan oogpijn" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Recent ontstane oogpijn moet beoordeeld worden. "

80) Triagecriterium "Oorpijn" is gewijzigd:

- *Ondersteuningsvragen* is gewijzigd: "Heeft u het oorpijn? oor pijn (pijn ladder)? Hoe lang? Wat kunt u nog wel doen? Wat kunt u niet meer door de pijn?"

81) Triagecriterium "Pijn aan wond na partus" is gewijzigd:

- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "10 jaar" naar ""
- *Relevant tot* is gewijzigd van "55 jaar" naar ""

82) Triagecriterium "Pijn bij het plassen" is gewijzigd:

- *Naam* is gewijzigd van "Pijn bij het plassen" naar "Pijn bij plassen"

83) Triagecriterium "Pijn tand/kies" is gewijzigd:

- *Ondersteuningsvragen* is gewijzigd: "Heeft u pijn? Hoe erg is de pijn (pijn ladder)? Wat kunt u nog wel doen? Wat kunt u niet meer door de pijn?"

84) Triagecriterium "Pijnlijk been met roodheid/zwelling" is gewijzigd:

- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "10 jaar" naar ""
- *Relevant tot* is gewijzigd van "55 jaar" naar ""

85) Triagecriterium "Pijnlijk oog" is gewijzigd:

- *Ondersteuningsvragen* is gewijzigd: "Heeft u pijn? Kunt Hoeveel u pijn de heeft pijn u omschrijven? (pijn ladder)? "

86) Triagecriterium "Pijnlijke thorax" is gewijzigd:

- *Ondersteuningsvragen* is gewijzigd: "Heeft u ~~pijn, hoe erg is de~~ pijn? Wat kunt u nog wel doen? Wat kunt u niet meer door de pijn?"

87) Triagecriterium "Placenta praevia" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Bij een placenta praevia ligt de placenta geheel of gedeeltelijk voor de baarmoedermond. Vaginaal bloedverlies kan een direct gevaar voor het kind betekenen doordat de moeder in shock raakt. Tevens kan het bloedverlies de uterus prikkelen en weeënactiviteit veroorzaken. "
- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "12 jaar" naar ""

88) Triagecriterium "Plankharde buik" is gewijzigd:

- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "12 jaar" naar ""

89) Triagecriterium "Priapisme" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Een een vaak pijnlijk erectie die ook zonder seksuele opwinding voorkomt. "

90) Triagecriterium "Ringvormige zwelling eikel" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Oedemateuze oedemateuze , sterk opgezette ring achter de eikel door afknelling waarbij een te nauwe voorhuid niet meer worden teruggeschoven (Spaanse kraag) "

91) Triagecriterium "Risico op ernstig letsel" is gewijzigd:

- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "12 jaar" naar "10 jaar"

92) Triagecriterium "Risicogroep" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Jonger dan drie maanden Verminderde weerstand, zoals transplantatiepatiënten, miltextirpatie en/of gebruik immuunsuppressie, chemotherapie Bepaalde chronische ziekten, zoals ziekte van Addison, diabetes, hartfalen en nierfalen Recente, relevante operatie (<1 week) nierfalen "
- *Ondersteuningsvragen* is gewijzigd: "Heeft u een chronische aandoening? Bent u transplantatiepatiënt? Wordt u behandeld met chemotherapie? Is uw milt verwijderd? Bent u de afgelopen week geopereerd? "

93) Triagecriterium "Rugpijn" is gewijzigd:

- *Ondersteuningsvragen* is gewijzigd: "Waar Hoe zit hevig is de pijn? Wat kunt u nog wel doen? Wat kunt u niet meer door de pijn?"
- Antwoorden zijn gewijzigd

94) Triagecriterium "Schedelhematoom" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Bult/bloeduitstorting op de schedel, dus niet op het aangezicht. 'Ja en klinisch relevant' = er is sprake van aanzienlijke zwelling of hematoom. "
- Antwoorden zijn gewijzigd

95) Triagecriterium "Schedeltrauma" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Recent schedel trauma is binnen 2 weken, zeer recent de afgelopen 24 uur. Indien langer dan 2 weken geleden is het antwoord 'nee' nee . "

96) Triagecriterium "Stand" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "'Abnormaal': Met 'Abnormaal' wordt bedoeld: alles behalve vinger/teen en onderarm/pols . Met 'Gereponeerd': 'Gereponeerd' wordt bedoeld: spontaan of met hulp gereponeerd gewricht."
- *Ondersteuningsvragen* is gewijzigd: "Is er een afwijkende stand? Zo Hoe ja, ziet waar? het eruit? "
- Antwoorden zijn gewijzigd

97) Triagecriterium "Stinkende afscheiding met buikpijn" is gewijzigd:

- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "10 jaar" naar ""
- *Relevant tot* is gewijzigd van "55 jaar" naar ""

98) Triagecriterium "Stolling afwijkend bij trauma" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Stollingsstoornis door ziekte of door gebruik van antistolling bloedverdunners . Kies 'Nee' bij gebruik van: Ascal (carbasaat calcium)Aspirine (acetylsalicylzuur)Plavix (clopidogrel)Efient (prasugrel)Brilique (ticagrelor). "
- *Ondersteuningsvragen* is gewijzigd: "Gebruikt u antistolling? bloedverdunners? Welke? Heeft u een stollingsstoornis door ziekte? "

99) Triagecriterium "Stomp-buiktrauma bij zwangerschap" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Door een stomp buiktrauma trauma kan in de baby buik of kunnen placenta buikorganen beschadigd raken. ; Dit kan de zoals baby placenta, in lever ernstige en problemen milt. bringen Dit en/of kan grote interne en levensbedreigende bloedingen geven.-"
- *Ondersteuningsvragen* is gewijzigd: "Bent u gevallen? Kan u hier meer over vertellen? Bent u op uw de buik gevallen? Heeft u een stoot voorwerp in de buik gehad?"

100) Triagecriterium "Tetanusindicatie" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Volgens RIVM-richtlijn: RIVM-richtlijn bij iedere wond. Liefst zo snel mogelijk, maar binnen 3 weken is ook nog zinvol. Open wond met (mogelijk) contact met straatvuil, aarde of mestDierenbeetDiepe 2e- en 3e-graads brandwonden (afh. van de aard en toedracht - contact met straatvuil, aarde of mest)Liefst zo snel mogelijk, maar binnen 3 weken is ook nog zinvol. "

101) Triagecriterium "Uitstraling buikpijn boven diafragma" is gewijzigd:

- *Naam* is gewijzigd van "Uitstraling buikpijn boven diafragma" naar "Uitstraling naar of pijn in schouderblad(en)/bovenrug"
- *Omschrijving* is gewijzigd: "Hiermee wordt Uitstraling 'referred kan pain' worden bedoeld. veroorzaakt Prikkeling door van de het nervus phrenicus-prikkeling middenrif bij door voelt, bloed-en/of lueht in de buikholte buik . Het Dit middenrif kan wordt bijvoorbeeld zijn aangestuurd veroorzaakt door de een nervus gebarsten phrenicus. EUG; Deze zenuwen lopen een via miltruptuur dezelfde of route na als een die laparoscopie van de schouder buik . Daardoor "denkt" het zenuwstelsel dat de pijn uit de schouder komt, terwijl de oorzaak eigenlijk in de buik ligt. Levensbedreigende Provoeatie/uitlokking oorzaken door van inspanning schouder- duidt of mogelijk bovenrugpijn op door eardiale referred pijn; kies pain: dan 'Pijn-thorax'. MiltruptuurLeverruptuurMaag- of darmperforatieDiafragmatische scheurErnstige pancreatitisBuitenbaarmoederlijke zwangerschap (ruptuur)Lekkend abdominaal aneurysma (AAA)Bij pijn/druk op de borst bij inspanning; kies dan ingangsklacht 'Pijn/druk thorax'. "
- *Ondersteuningsvragen* is gewijzigd: "Straalt de pijn ook uit? Heeft u nog ergens Waarnaar anders pijn? toe? "
- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "12 jaar" naar "10 jaar"

102) Triagecriterium "Urgentieverhogende factoren" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Bepaal of er sprake is van: Gebruik van stimulerende drugs, zoals cocaïne, MDMA (xtc), 4-FA en speed (geldt tot 4 dagen na gebruik)Cardiale speedCardiale voorgeschiedenis van de patiënt zelf, zoals premature atherosclerose, aangeboren vernauwingen van de aorta of (geopereerd aan) aangeboren hartaandoeningAcute hartdood of ernstig cardiaal lijden bij een eerstegraads familielid jonger dan 50 jaar (biologische vader, moeder, broer of zus)Zwangere of kraamvrouw. "

103) Triagecriterium "Verminderde kindsbewegingen" is gewijzigd:

- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "12 jaar" naar ""

104) Triagecriterium "Vermoeden uitgezakte delen" is gewijzigd:

- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "12 jaar" naar ""
- *Relevant tot* is gewijzigd van "55 jaar" naar ""

105) Triagecriterium "Vochtverlies" is gewijzigd:

- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "12 jaar" naar ""

106) Triagecriterium "Weeënactiviteit" is gewijzigd:

- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "12 jaar" naar ""

107) Triagecriterium "Zieke indruk volwassene" is gewijzigd:

- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "12 jaar" naar "10 jaar"

108) Triagecriterium "Zwangerschapsduur" is gewijzigd:

- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "12 jaar" naar ""

109) Triagecriterium "Inhalatie gevaarlijke stoffen" is verwijderd.

110) Triagecriterium "Kraambed" is verwijderd.

111) Triagecriterium "Landbouwgif" is verwijderd.

112) Triagecriterium "Uitstraling rugpijn" is verwijderd.

Triagetypen

Er zijn geen wijzigingen.

Urgentiecategorieën

Er zijn geen wijzigingen.

Urgentiecategorie Afwijkingen

113) Urgentiecategorie Afwijking "Palliatieve zorg" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd van "Palliatieve zorg" naar "Terminale zorg"

Vervolgacties

Er zijn geen wijzigingen.

Vervolgactie Afwijkingen

114) Vervolgactie Afwijking "Lokale/regionale afspraak" is toegevoegd.

115) Vervolgactie Afwijking "Locatie patiënt" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd van "Locatie patiënt" naar "Lokatie patiënt"

116) VervolgactieAfwijking "Palliatieve zorg" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd van "Palliatieve zorg" naar "Terminale zorg"

Ziektebeelden

117) Ziektebeeld "Hersenschudding" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Functiestoornis van de hersenen zonder aantoonbare schade aan de hersenen. Een hersenschudding kenmerkt zich mogelijk door de volgende verschijnselen: bewusteloosheid van minder dan vijftien minuten in aansluiting op een schedeltrauma; amnesie (hiaat in het geheugen) van minder dan een uur voor en/of aansluitend op het ongeval; misselijk, overgeven, duizeligheid; verwardheid en/of onrust maar ook slaperigheid aansluitend op het ongeval; hoofdpijn. De meeste patiënten herstellen van een hersenschudding binnen enige uren tot dagen. Duizeligheid, concentratiestoornis, vergeetachtigheid en emotionele klachten als angst, depressie en labiliteit kunnen wel optreden. In de eerste 24 uur moet de patiënt (thuis) worden geobserveerd (~~wekadvies~~) om tijdig de complicaties van een schedelletsel zoals bloedingen en oedeem te signaleren. Daarna is gedoseerde rust het verstandigste. Bedoeld wordt dat de patiënt zijn grenzen in acht neemt, dus alleen die dingen doet die geen aanleiding geven tot duizeligheid, misselijkheid en hoofdpijn. Wanneer deze klachten het beeld overheersen en duidelijk langer dan enkele dagen aanhouden, spreekt men van een postcommotioneel syndroom. Een lastig ziektebeeld, dat behandeld dient te worden door de eigen huisarts. "

118) Ziektebeeld "Trauma oog" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Door een kneuzing kunnen alle inwendige structuren van het oog beschadigd raken. Vooral een klap op het oog met een voorwerp dat kleiner is dan de opening van de orbita zoals een squashbal, is gevaarlijk. Bij een perforatie is perforatieis er cornea- of scleraverscheuring. De visus is bijna altijd verminderd. Meestal doet een perforatie weinig pijn. "

119) Ziektebeeld "Vegetatieve verschijnselen" is gewijzigd:

- *Naam* is gewijzigd van "Vegetatieve verschijnselen" naar "Shockverschijnselen"
- *Trefwoorden* is gewijzigd van "Vegetatieve verschijnselen, vegetatief, shock" naar "Shock"